

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Borago officinalis</i> L. İngilizce: Borage Türkçe: Hodan Sinonimi (varsa): <i>Borago hortensis</i> L.
FAMİLYASI	Boraginaceae
KULLANILAN KISMI	Tohumdan Elde Edilen Sabit Yağı
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Pirolizidin alkaloidleri karaciğer hasarına neden olmaktadır. Karaciğer harabiyeti ya da karaciğer hastalığı bulunanlarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Pirolizidin alkaloidleri özellikle yüksek dozda ya da uzun süre kullanılmamalıdır.</p> <p>Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.</p> <p>Kanama riskini arttırdığı ve kanama zamanını uzattığı bildirilmiştir. Kanama riski olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.</p> <p>Cerrahi girişim uygulanacak kişilerde, cerrahi girişimden 2 hafta önce kullanımı sonlandırılmalıdır.</p> <p>Epilepsi ve şizofreni hastaları tarafından kullanılmamalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER	Fenotiyazin ile epilepsi tedavisi görenler tarafından kullanılmamalıdır.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none">1) Asian Pac J Trop Med 2014; 7(Suppl 1): S22-S282) https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-596/borage3) https://www.herbal-supplement-resource.com/borage-herb.html