

▼ Deferasiroks İçeren Film Kaplı Tablet Tedavisine İlişkin Hasta Kılavuzu

ADI SOYADI:

TARİH:

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler kılavuzunuz

Bu kılavuz size reçete edilen formülasyona bağlı olarak, deferasiroks içeren film kaplı tabletlerin doğru kullanımı dahil olmak üzere önemli bilgiler içermektedir. Bu kılavuz, tedavinizin takibi, olası yan etkileri ve deferasiroks içeren film kaplı tabletler ile tedavi sırasında diğer ilaçların kullanımı konusunda size bilgi verecektir.

İçindekiler

Terimler	2
Hasta hakkında ön bilgi	3
Deferasiroks içeren ilaçlara başlarken	4
Deferasiroks içeren film kaplı tabletler ve suda dağılılabilen tabletler hakkında bilgiler	5
Deferasiroks içeren suda dağılılabilen tabletler	5
Deferasiroks içeren suda dağılılabilen tabletleri nasıl kullanmalıyım?	5
Deferasiroks içeren film kaplı tabletler	7
Deferasiroks içeren film kaplı tablet nedir?	7
Deferasiroks içeren film kaplı tabletler nasıl etki ediyor?	7
Neden bana deferasiroks içeren film kaplı tabletler reçete edildi?	7
Deferasiroks içeren film kaplı tabletleri nasıl kullanmalıyım?	8
Deferasiroks içeren film kaplı tabletleri hangi dozda almalıyım?	8
Deferasiroks içeren hangi tablet/tabletleri kullanacağım?	8
Deferasiroks içeren film kaplı tabletleri ne zaman kullanmalıyım?	8
Deferasiroks içeren film kaplı tabletleri nasıl kullanmalıyım?	8
Tedavim nasıl takip edilecek?	9
Deferasiroks içeren film kaplı tabletlerin yan etkileri var mı?	10
Deferasiroks içeren film kaplı tabletler başka ilaçlarla birlikte kullanılabilir mi?	11
Deferasiroks içeren film kaplı tabletler ile kaydettiğim düzelme	12
Tedavi hedefim	12
Deferasiroks içeren film kaplı tablet dozum	12

Terimler

Majör beta talasemi

Kanda yeterli miktarda normal hemoglobinin bulunmadığı, kalıtsal bir kan hastalığı.

Biyopsi

İncelenmek üzere küçük bir vücut dokusu örneği almayı içeren tıbbi bir prosedür.

Kreatinin

Kaslar tarafından üretilen bir kimyasal atık ürün. Sağlıklı böbrekler, kreatinini ve diğer atık ürünleri kandan süzer ve bunlar idrar şeklinde atılır.

Serum ferritini (SF)

Serum ferritin (SF) düzeyiniz kanınızdaki demir miktarını gösterir.

MRG

Manyetik rezonans görüntülemeyle tarama, organları incelemek için yapılan bir testtir; karaciğerinizdeki demir miktarını belirlemek için kullanılabilir.

Miyelodisplastik sendrom (MDS)

Sağlıklı kan hücrelerinin sayısının düşmesine sebep olan bir kan hastalığı.

Diğer anemiler

Kandaki hemoglobin seviyeleri düşüktür.

Orak hücre hastalığı - alyuvarları etkileyen kalıtsal bir grup hastalık

Orak hücre hastalığı olan insanlar, alışılmadık şekilli kırmızı kan hücreleri üretirler ve bu durum problemlere neden olabilir, çünkü sağlıklı kan hücreleri kadar yaşamazlar ve kan damarlarında sıkışabilirler.

Hasta hakkında ön bilgi

Sizinle ilgili ön bilgiler, deferasiroks tedavisi planlanırken hem size hem de doktorunuza yardımcı olacaktır. Bu soruları yanıtlarken yardıma ihtiyacınız olursa, doktorunuza başvurunuz.

Genel bilgi

Adı:

Soyadı:

Doğum tarihi:

Tanı:

Size hiç kan transfüzyonu yapıldı mı?
Yapıldıysa, kaç defa ve ne sıklıkta yapıldı?

Başka bir sağlık sorununuz var mı?

Şu anda başka bir sağlık sorunu nedeniyle herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz?

Alerjiniz var mı?

Deferasiroks içeren ilaçlara başlarken

Doktorunuz hedeflenen SF düzeyinize ve deferasiroks dozunuza karar verdikten sonra kaydettiğiniz düzelmeyi takip etmeye başlayabilirsiniz. Aşağıda yer alan tedavi hedefleri ve diğer bilgiler bölümünü doktorunuzla birlikte doldurunuz.

Tarih:

Mevcut SF düzeyim:

Tedavi hedefim:	Deferasiroks doz rejimim:
SF düzeyimi düzeyine düşürmek	<ul style="list-style-type: none">• Bana deferasiroks içeren suda dağılılabilen tablet mi, film kaplı tablet mi reçete edildi?• Dozum nedir?• Her gün kaç tablet alacağım?• Suda dağılılabilen tabletler verildiyse, her bir dozu ne kadar sıvıya karıştırmalıyım?• İlacımı her gün kaçta alacağım?
Kilom:	
Notlar: Doktorunuzla yaptığınız görüşmeye ait notlarınızı veya sorularınızı buraya yazın.	

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler ve suda dağılılabilen tabletler hakkında bilgiler

Deferasiroks içeren ilaçların iki formu mevcuttur ve farklı şekillerde alınması gerektiği için her form farklı şekil ve renktedir.

İlaçlarınızı doktorunuzun talimatına göre almanız önemlidir.

Deferasiroks içeren suda dağılılabilen tabletler:

Sıvı içinde çözündürülerek aç karnına alınması gereken yuvarlak tabletlerdir. Günde 1 defa, aç karnına, yemekten en az 30 dakika önce, tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır.

Suda dağılılabilen tabletler, bir bardak (100 – 200 ml) su veya portakal ya da elma suyu içerisinde, ince bir süspansiyon meydana gelinceye kadar karıştırılarak eritilir. Süspansiyon içildikten sonra, bardakta kalabilecek herhangi bir artık, az miktarda su veya meyve suyuyla yeniden süspansiyon haline eritilerek içilmelidir. Tabletler çiğnenmemeli veya tüm olarak yutulmamalıdır.



Gösterilen tabletler gerçek boyutlarında değildir.

Film kaplı tabletlerden suda dağılılabilen tabletlere geçiş yapıyorsanız, doz ayarlamasına ihtiyaç duyacaksınız. Doktorunuz ve/veya eczacınız size doğru dozu önerecektir. Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Deferasiroks içeren suda dağılılabilen tabletleri nasıl kullanmalıyım?

Deferasiroks içeren suda dağılılabilen tabletleri hangi dozda almalıyım?

Deferasiroks içeren suda dağılılabilen tabletin reçete edilen dozu kilonuza, mevcut demir düzeyinize ve kan transfüzyonu sıklığınıza göre belirlenmektedir.

Deferoksamin infüzyonlarından deferasiroks suda dağılılabilen tabletlere geçiyorsanız, doktorunuz deferasiroks dozunu ne kadar deferoksamin kullandığınıza bağlı olarak seçebilir.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen hangi tablet/tabletleri kullanacağım?

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler farklı tablet boyutlarında sunulmuştur ve bazı durumlarda birden fazla tablet almanız gerekebilir. Doktorunuz her gün hangi boyuttaki tablettan kaç adet almanız gerektiğini size söyleyecektir.



Gösterilen tabletler gerçek boyutlarında değildir.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tableti ne zaman kullanmalıyım?

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri günde bir defa ve her gün aynı saatte almanız gerekmektedir. Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin her gün aynı saatte alınması, tabletinizi ne zaman almanız gerektiğini hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Deferasiroks içeren suda dağılabilen tableti aç karnına alınız ve aldıktan sonra en az 30 dakika geçmeden bir şey yemeyiniz.

Deferasiroks suda dağılabilen tabletlerin kullanım adımları



1. Adım:

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletinizi (tabletlerinizi) bir bardak portakal suyu, elma suyu veya suya atarak eritiniz. Tam olarak doktorunuz tarafından belirtilen miktarda sıvı kullanmaya özen gösteriniz.



2. Adım:

Sıvı ve deferasiroks içeren suda dağılabilen tableti (tabletleri) homojen bir karışım elde edene kadar karıştırınız. Karışım yoğun kıvamlı olabilir.



3. Adım:

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet karışımının tamamını tek seferde içiniz. Bardakta kalan kısma biraz daha meyve suyu veya su ekleyiniz ve bu sıvıyı da içiniz.

Tabletleri çiğnemeyiniz veya bütün olarak yutmayınız ve tabletleri kırmayınız veya ezmeyiniz. Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri gazlı içecekler veya süt içinde eritmeyiniz.

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler:

Bir miktar su ile yutulması gereken oval film kaplı tabletlerdir. Bütün tableti yutamayacak durumdaki hastalar için, film kaplı tabletler ezilip yumuşak bir yiyecek üstüne, örn. yoğurt veya elma sosu (elma püresi) serpilerek verilebilir.

Dozun tamamı derhal alınmalıdır ve gelecekte kullanılmak üzere saklanmamalıdır. Film kaplı tabletler günde 1 defa, tercihen her gün aynı saatte ve aç karnına veya hafif bir yemekle birlikte alınmalıdır.



Gösterilen tabletler gerçek boyutlarında değildir.

Deferasiroks içeren film kaplı tablet nedir?

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler, vücuttaki demir fazlasının atılmasına yardımcı olan bir demir şelatörüdür (demir bağlayıcı veya “şelatlaştırıcı” ajandır).

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler nasıl etki ediyor?

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler, “**şelasyon**” adı verilen bir işlem aracılığıyla etkisini göstermektedir. Deferasiroks içeren film kaplı tabletler alındıktan sonra kana karışır ve bulunduğu demir fazlasını “yakalar”.



Neden bana deferasiroks içeren film kaplı tabletler reçete edildi?

Transfüzyon (kan nakli) gerektiren çeşitli hastalıklar bulunmaktadır:

- Beta-talasemi majör
- Orak hücre hastalığı (OHH)
- Miyelodisplastik sendrom (MDS)
- Diğer anemiler

Sizde bu rahatsızlıklardan biri varsa, size de muhtemelen birkaç defa kan transfüzyonu yapılmıştır. Kan transfüzyonları, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu düzeyde eritrosit (alyuvar) içerir ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Size yapılan her kan transfüzyonu demir içermektedir. Eritrositler aracılığıyla vücudunuzda oksijenin taşınması için demir kullanılması nedeniyle, demir ayrı bir önem taşımaktadır.

Ancak vücut, demir fazlasını kendiliğinden uzaklaştıramamaktadır.

Her transfüzyonla birlikte vücutta belirli bir miktarda demir birikir. Bu, vücudunuzda demir fazlasına neden olur ve **kronik aşırı demir yükü** olarak adlandırılır. Aşırı miktarda demir tehlikeli olabilir ve kalp, karaciğer gibi organlarınıza zarar verebilir.

Vücudunuzdaki demiri sağlıklı ve güvenli bir düzeyde tutmak için bu demir fazlasının atılması gerekmektedir.

Deferasiroks içeren film kaplı tabletleri nasıl kullanmalıyım?

Deferasiroks içeren film kaplı tabletlerinizi doktorunuzun direktifi doğrultusunda kullanınız.

Deferasiroks içeren film kaplı tabletleri hangi dozda almalıyım?

Deferasiroks içeren film kaplı tabletin reçete edilen dozu kilonuza, mevcut demir seviyenize, karaciğer ve böbrek fonksiyonunuza ve ne sıklıkla transfüzyon aldığınıza göre belirlenmektedir.

Deferasiroks içeren suda dağılılabilen tabletlerden, deferasiroks içeren film kaplı tabletlere geçiş yapıyorsanız daha düşük bir doz gerekecektir. Deferoksamin infüzyonlarından deferasiroks film kaplı tabletlere geçiyorsanız, doktorunuz deferasiroks dozunuza ne kadar deferoksamin kullandığınıza bağlı olarak seçebilir.

Deferasiroks içeren hangi tablet/tabletleri kullanacağım?

Deferasiroks içeren film kaplı tabletlerin boyutları farklıdır ve bazı durumlarda birden fazla tablet almanız gerekebilir. Doktorunuz her gün hangi boyuttaki tablettten kaç adet almanız gerektiğini size söyleyecektir.



Gösterilen tabletler gerçek boyutlarında değildir.

Deferasiroks içeren film kaplı tabletleri ne zaman kullanmalıyım?

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler günde 1 defa, tercihen her gün aynı saatte ve aç karnına veya hafif bir yemekle birlikte alınmalıdır.

Deferasiroks içeren film kaplı tabletleri nasıl kullanmalıyım?

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler bir miktar su ile yutulması gereken tabletlerdir. Bütün tableti yutamayacak durumdaki hastalar için, film kaplı tabletler ezilip yumuşak bir yiyecek üstüne, örn. yoğurt veya elma sosu (elma püresi) serpilerek verilebilir.

Dozun tamamı derhal alınmalıdır ve gelecekte kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

Bir doz almayı unutursam ne yapmalıyım?

Bir deferasiroks dozunu (film kaplı tablet veya suda dağılılabilen tablet) almayı unuttuğunuz takdirde, üzerinden uzun bir süre geçmiş olsa dahi hatırladığınız anda o dozu alın. Bir sonraki dozunuza almanız gereken saatte alınız. Unutulan tableti(tabletleri) telafi etmek üzere sonraki gün iki doz almayınız.

Almam gerekenden daha fazla deferasiroks alırsam ne yapmalıyım?

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla deferasiroks içeren tablet (film kaplı tablet veya suda dağılılabilen tablet) kullandıysanız derhal doktorunuza başvurunuz veya acil servislerle iletişime geçiniz çünkü tıbbi tedavi gerekli olabilir.

Tedavim nasıl takip edilecek?

Deferasiroks içeren film kaplı tablet (deferasiroks) kullanımı esnasında düzenli olarak laboratuvar testleri yapılacaktır. Bu testler yoluyla tedaviye verdiğiniz yanıt takip edilecektir. Bu testlere göre dozunuzun azaltılması veya artırılması gerekebilir.

Test	Deferasiroks içeren film kaplı tabletlere başlamadan önce	Ayda bir	Yılda bir
Demir Serum ferritini	√	√	
Böbrek fonksiyonu Serum kreatinini	√ Deferasiroks içeren film kaplı tablete başlamadan önce bu test iki defa yapılacaktır.	√ İlk ay boyunca ve doz değiştirildikten sonraki birinci ayda (formülasyon geçişleri dahil) haftada bir ve daha sonra ayda bir defa kontrol edilecektir.	
Kreatinin klerensi (Böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını görmek için)	√	√ İlk ay boyunca ve doz değiştirildikten sonraki birinci ayda (formülasyon geçişleri dahil) haftada bir ve daha sonra ayda bir defa kontrol edilecektir.	
Karaciğer fonksiyonu (Serum transaminazları, bilirubin, alkalen fosfataz)	√	√ İlk ay boyunca 2 haftada bir ve daha sonra ayda bir defa kontrol edilecektir.	
İdrar (İdrarda protein)	√	√	
Duyuma ve görme	√		√
Çocuk ve ergen hastalar Beden gelişimi (örn., kilo, cinsel gelişim ve yıllık büyüme oranı) değerlendirilir.	√		√

Dozunuzun azaltılması veya artırılması gerekebilir.

Doktorunuz ayrıca,

- Kalp veya karaciğerinizdeki demir düzeylerini kontrol etmek için manyetik rezonans görüntüleme (**MRG**) adı verilen bir yöntem kullanabilir.
- Ciddi böbrek hasarından şüpheleniyorsa, böbrek **biyopsisi** yapabilir.
- Diğer böbrek tübüler fonksiyon belirteçleri için testler (diyabetik olmayanlarda glikozüri ve düşük serum potasyum, magnezyum seviyeleri veya urat, fosfatüri, aminoasidüri gibi) gerekiyorsa yapılacaktır.

Deferasiroks içeren film kaplı tabletlerin yan etkileri var mı?

Her ilaç gibi deferasiroks içeren film kaplı tabletlerin de birtakım yan etkileri vardır; ancak bu yan etkiler tüm hastalarda görülmez. Yan etkilerin çoğu hafif-orta şiddettedir ve genellikle tedaviye alındıktan sonra ortadan kalkmaktadır. Yan etkilerin ortadan kalkması için birkaç gün ila birkaç hafta geçmesi gerekebilir. Yaygın yan etkiler arasında bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık, deri döküntüsü ve baş ağrısı yer almaktadır.

Deferasiroks içeren film kaplı tablet tedavisine başlamadan önce böbrek ve karaciğer fonksiyon testi yapılacak ve bu fonksiyonlar tedavi boyunca düzenli olarak takip edilecektir (Önceki sayfadaki tabloya bakınız).

Bazı yan etkiler ciddi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Bu yan etkiler seyrek veya nadiren görülmektedir. Aşağıdakilerden herhangi biri meydana geldiği takdirde, ilacı kullanmayı bırakınız ve hemen doktorunuza başvurunuz:

- Şiddetli deri döküntüsü veya nefes alma güçlüğü ve baş dönmesi veya özellikle yüz ve boğazda şişme (şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri)
- Şiddetli deri döküntüsü, ciltte kızarıklık, dudaklar, gözler veya ağızda kabarcıklanma, cildin soyulması, boğaz ağrısı (şiddetli cilt reaksiyonu belirtileri)
- İdrar miktarında belirgin azalma (böbrek rahatsızlığı belirtisi)
- Bir arada görülen sersemlik, karnın sağ üst kısmında ağrı, cilt veya gözlerde sararma veya aşırı sararma ve koyu renkli idrar (karaciğer rahatsızlığı belirtileri)
- Kanlı kusma ve/veya siyah dışkılama
- Özellikle yemek yedikten veya deferasiroks aldıktan sonra görülen karın ağrısı, sık görülen mide yanması
- Şiddetli üst mide ağrısı (pankreatit)
- Sık sık mide yanması
- Kısmi görme kaybı

Unutmayınız:

Her türlü yan etkiyi mutlaka doktorunuza bildirin. Ciddi yan etki meydana gelmesi durumunda ilacı kullanmayı BIRAKINIZ ve hemen doktorunuza başvurunuz. Yan etkiler ve ciddi yan etkiler hakkında daha detaylı bilgi için Hasta Kullanma Talimatı'na bakınız.

Yan Etkilerin Bildirimi:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler başka ilaçlarla birlikte kullanılabilir mi?

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler, başka demir şelatörleriyle birlikte kullanılmamalıdır. Alüminyum dahil olmak üzere antasitler (mide ekşimesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar) deferasiroks içeren film kaplı tablet ile günün aynı zamanında kullanılmamalıdır.

Başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız, bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu durum reçetesiz ilaçlar için de geçerlidir. Doktorunuz bu ilaçların etkisini takip etmek üzere laboratuvar tetkikleri isteyebilir.

Doktorunuza bildirmeniz gereken önemli ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

- Deferasiroks içeren film kaplı tabletler ile birlikte alınmaması gereken diğer demir şelatörleri
- Deferasiroks içeren film kaplı tabletler ile günün aynı zamanında kullanılmaması gereken alüminyum dahil olmak üzere antasitler (mide ekşimesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- Siklosporin (vücudun nakledilen bir organı reddetmesini önlemek için veya romatoid artrit veya atopik dermatit gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
- Simvastatin (kolesterolü düşürmek için kullanılır)
- Belirli ağrı kesiciler veya iltihap giderici (antiinflamatuvar) ilaçlar (örn. aspirin, ibuprofen, kortikosteroidler)
- Ağızdan alınan (oral) bisfosfonatlar (osteoporoz [kemik erimesi] tedavisinde kullanılır)
- Kan pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçlar
- Hormonal kontraseptif ajanlar (doğum kontrol ilaçları)*
- Bepridil (kardiyak nedenli göğüs ağrısı tedavisinde kullanılır)
- Ergotamin (migren tipi baş ağrısı tedavisinde kullanılır)
- Repaglinid (diyabet [şeker hastalığı] tedavisinde kullanılır)
- Rifampisin (verem ([tüberküloz] tedavisinde kullanılır)
- Fenitoin, fenobarbital, karbamazepin (sara [epilepsi] tedavisinde kullanılır)
- Ritonavir (HIV enfeksiyonu [AIDS hastalığı] tedavisinde kullanılır)
- Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılır)
- Teofilin (astım gibi solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
- Klozapin (şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılır)
- Tizanidin (kas gevşetici olarak kullanılır)
- Kolestiramin (kanda kolesterol düzeyi düşük olduğunda kullanılır)
- Midazolam (yatıştırıcı olarak, anksiyete ve amnezi tedavisinde kullanılır)

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler ile kaydettiğim düzelme

Tedavi hedefim

Deferasiroks içeren film kaplı tabletler tedavisinin amacı, vücudunuzdaki demiri sağlıklı bir düzeyde tutmaktır. Tedavi hedefinize ulaşma yolunda kaydettiğiniz düzelmeyi takip etmek üzere her ay doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Doktorunuz serum ferritini testi adı verilen bir kan testine dayanarak tedavi hedeflerinizi belirleyecektir. Bu testle serum ferritin (SF) düzeyiniz belirlenmektedir. SF düzeyi, vücudunuzda ne kadar demir olduğunu göstermektedir. Doktorunuz SF düzeyinizi düşürmek isteyebilir veya mevcut düzeyde tutabilir.

Deferasiroks içeren film kaplı tablet dozumu

Doktorunuz; serum ferritin düzeyinize (SF), diğer laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara veya kan transfüzyonu sıklığınıza bağlı olarak kullandığınız deferasiroks içeren film kaplı tablet dozunu değiştirmeye karar verebilir.

3-6 ay boyunca deferasiroks içeren film kaplı tablet aldıktan sonra planlanan şekilde düzelme gösterip göstermediğinizi görmek üzere doktorunuza başvurunuz. Planlanan şekilde düzelme göstermiyorsanız, doktorunuza tedavi hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak planla ilgili sorular sorunuz.

Her doktor ziyareti arasında

Doktor ziyaretleri arasında başka önemli olaylar meydana gelebilir. Bu olayları kaydetmeli ve doktorunuza bildirmelisiniz. Bu olaylar arasında şunlar yer almaktadır:

- Yan etkiler
- Birlikte kullanmaya başlayacağınız başka ilaçlar
- Reçete edilen dozdan sapmalar

* Halihazırda gebeliği önlemek için bir oral kontraseptif veya bir flaster kontraseptif kullanıyorsanız, ilave ya da farklı bir doğum kontrol yöntemi (örn. prezervatif) kullanmalısınız; çünkü deferasiroks oral ve flaster kontraseptiflerin etkililiğini azaltabilir.

▼ Deferasiroks İeren Film Kaplı Tablet Tedavisine İlişkin Hasta Kılavuzu

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İla Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.