

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Potentilla tormentilla</i> Stokes İngilizce: Common tormentil, Cinquefoil Türkçe: Kurtpençesi, Beşparmak otu Sinonimi: <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch, <i>Potentilla laeta</i> Salisb., <i>Potentilla officinalis</i> Gray, <i>Fragaria tormentilla</i> Crantz
FAMİLYASI	Rosaceae
KULLANILAN KISMI	Kurutulmuş rizomları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Yüksek tanen içeriğinden dolayı bulantı ve kusma gibi gastrointestinal şikâyetler görülebilir</p> <p>Diyarenin tedavisinde 3 günden fazla, ağız-yutak inflamasyonu tedavisinde ise 1 haftadan fazla kullanılması ile belirtilerin geçmemesi durumunda bir hekime danışılmalıdır.</p> <p>Tekrarlayan diyare veya kanlı dışkı görülürse bir hekime danışılmalıdır.</p> <p>İçerdiği aktif maddelere karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır.</p> <p>Eş zamanlı uygulanan başka ilaçların emilimini geciktirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların alımından en az 1 saat önce veya sonra kullanılmalıdır.</p> <p>18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri bulunmaması nedeniyle hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Antibiyotikler, aglutinasyon ajanları, antikoagülanlar, antidiyabetikler, antielsataz ajanlar, antiinflamatuvarlar, antiviraller, sitotoksik ajanlar, gastrointestinal ajanlar, büyümeyi uyarıcı ajanlar, hidrokortizon ve pulmoner ajanlarla etkileşebilir.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none">1) EMA Monografları, 20102) FFD Monografları, 20173) PDR for Herbal Medicines, 20004) The Complete German Commission E Monographs, 19985) ESCOP Monografları, 20136) http://www.sawallhf.com/ns/DisplayMonograph.asp?StoreID=5b7cc3ad003b48f0ac456c43f7b38bef&DocID=basic-interactions-tormentil