

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz Bip. İngilizce: Feverfew Türkçe: Gümüş düğme Sinonimi : <i>Chrysanthemum parthenium</i> (L.) Bernh., <i>Leucanthemum parthenium</i> (L.) Gren.&Gordon, <i>Matricaria parthenium</i> L., <i>Pyrethrum parthenium</i> (L.) Sm.
FAMİLYASI	Asteraceae
KULLANILAN KISMI	Toprak üstü kısımları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Asteraceae familyasına alerjisi olanlarda ve uterotonik etkisi nedeniyle hamilelerde kullanılmamalıdır.</p> <p>Kullanımı sırasında sıklık belli olmamakla birlikte ağız ülserleri ve gastrointestinal şikayetler oluştuğu rapor edilmiştir.</p> <p>Yeterli veri bulunmaması nedeniyle emzirme döneminde kullanılmamalıdır.</p> <p>18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.</p> <p>İki ay kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER	CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4 ile metabolize olan ilaçlar, aspirin ve varfarin gibi antikoagülanlar ve antiplatelet ilaçlar ile etkileşim gösterir.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none"><li>1) FFD Monografı, 2011.</li><li>2) ESCOP Monografı, 2003.</li><li>3) PDR for Herbal Medicines, 2000.</li><li>4) EMA Monografı, 2011.</li></ol>