

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. Ex Schult.) DC. İngilizce: Cat's claw Türkçe: Kedi pençesi Sinonimi: <i>Uncaria surinamensis</i> Miq.
FAMİLYASI	Rubiaceae
KULLANILAN KISMI	Kök kabukları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Uzun süre kullanımda serum östradiol ve progesteron seviyeleri düşebilir.</p> <p>Otoimmün hastalığı olan kişilerde kontrendikedir.</p> <p>Kullanıldığı ilk bir iki haftada kabızlık ya da diyareye neden olabilir.</p> <p>Yeterli veri bulunmaması nedeniyle hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir.</p> <p>Kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	CYP3A4 ile metabolize olan ilaçlarla, immüsupresan ilaçlarla, proteaz inhibitörleri, kalsiyum kanal blokörleri, antihipertansif ilaçlar ile etkileşim gösterir. Antikoagülan, antiplatelet ve trombolitik ajanlar, düşük molekül ağırlıklı heparinlerle birlikte kanamalara sebep olacağından dolayı kullanılmamalıdır.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none">1) PDR for Herbal Medicines, 2007.2) EMA Monografları, 2015.3) WHO Monografları, 2007.4) Rx List