

Opsumit® ile tedavi sırasında oluşan bir gebelik veya ortaya çıkan herhangi bir yan etkiyi hemen reçetenizi yazan doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

Tedavi merkezi:

Reçeteleyen doktorun adı:

Reçeteleyen doktorun telefon numarası:

Opsumit® için önerilen doz günde bir defa 10 mg'lık bir tablettir. Tüm tableti bir bardak su ile yutun, çiğnemeyin veya tableti kırmayın. Opsumit® 'i yemeklerle beraber veya ayrı alabilirsiniz.

Opsumit® almayı unutmanız durumunda, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alın ve sonrasında tabletlerinizi her zaman aldığınız zamanda almaya devam edin. Unutulan tableti yerine koymak için hiçbir zaman iki tableti beraber almayın.

Opsumit® hakkında daha detaylı bilgi için, lütfen hasta bilgilendirme broşürünü dikkatlice okuyun. Tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

©2012 Actelion Pharmaceuticals Ltd
Opsumit® Actelion Pharmaceuticals Ltd'nin tescilli markasıdır

▼ OPSUMIT® _HASTA KARTI

Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi için

Bu kart OPSUMIT® ile tedavi sırasında bilmeniz gereken önemli güvenlik bilgileri içermektedir. Bu kartı her zaman yanınızda taşıyın ve medikal bakımınızda yer alan tüm doktorlara gösteriniz.

▼ Opsumit® 10 mg Masitentan film kaplı tablet

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulunmuş olacaksınız. Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezine (TUFAM) ve/veya Actelion Ürün Güvenliliği Departmanına doğrudan e-posta (drugsafetytr@actelion.com) veya telefon aracılığı ile (0212 362 10 00) bildiriniz.

<p><u>Gebelik</u> Opsumit® fetusun gelişimine zarar verebilir. Bu nedenle gebe olmanız halinde Opsumit® kullanmamalısınız ve Opsumit® kullanırken gebe kalmamalısınız. Ayrıca, pulmoner arteriyel hipertansiyonunuz varsa, gebelik hastalığınız semptomlarını ciddi şekilde kötüleştirebilir.</p> <p><u>Gebelikten korunma</u> Opsumit® kullanırken gebelikten korunmak için güvenilir bir yöntem kullanmanız gerekmektedir. Oluşabilecek herhangi bir sorunu doktorunuzla konuşmanız gerektiğinde emin olunuz.</p>	<p><u>Gebe olmadığınızı düşünseniz bile Opsumit® tedavisine başlamadan önce ve tedavi sırasında her ay gebelik testi yaptırmalısınız.</u></p> <p>Bu sınıfta yer alan diğer ilaçlar gibi, Opsumit® anemiye (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azlığı) indükleyebilir ve karaciğer üzerinde etkileri olabilir. Opsumit® ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında doktorunuz aşağıdakileri kontrol etmek amacıyla kan testleri yapılmasını isteyecektir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aneminiz olup olmadığı (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azlığı)• Karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığı	<p>Karaciğerinizin düzgün çalışmadığına dair belirtiler arasında:</p> <ul style="list-style-type: none">• bulantı (kusma isteği)• kusma• ateş (yüksek ateş)• karında ağrı (abdomen)• sarılık (cildinizin veya gözlerinizin beyazının sararması)• koyu-renkli idrar• cildinizde kaşıntı• letarji veya yorgunluk (olağandışı yorgunluk veya bitkinlik)• gribe benzer sendrom (ateşle birlikte eklem ve kas ağrıları) <p>Bu belirtilerden herhangi birini yaşamanız durumunda, hemen doktorunuza bilgi verin.</p>
---	---	---