

KULLANMA TALİMATI

LAKSOTEK PEDİATRİK supozituar

Makattan (Rektal yol ile) uygulanır.

- **Etkin madde:** Her bir supozituar (fitil) 5 mg bisakodil içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Witepsol E75 ve Witepsol E45 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **LAKSOTEK PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?**
2. **LAKSOTEK PEDİATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **LAKSOTEK PEDİATRİK nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **LAKSOTEK PEDİATRİK'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. LAKSOTEK PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?

- Her bir supozituar (fitil) 5 mg etkin madde (bisakodil) içerir. Bisakodil kontakt laksatifler ilaç grubundandır.
- LAKSOTEK PEDİATRİK hastanın kabızlık şikayetlerinin tedavisinde uyarıcı laksatif (ishal yapıcı) olarak kullanılmaktadır.
- LAKSOTEK PEDİATRİK ameliyat ya da röntgen gibi araştırma işlemlerinden önce bağırsak boşaltılmasında ve tüm endikasyonlarda müshil, lavman yerine kullanılmaktadır.

2. LAKSOTEK PEDİATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAKSOTEK PEDİATRİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Etkin madde veya bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

- Aşırı su kaybınız var ise
- Bağırsak tıkanıklığınız var ise (ileus olarak adlandırılan)
- Apandisit gibi karın bölgesine özel ciddi rahatsızlığınız var ise
- Mide bulantısı ve kusma ile birlikte karın ağrınız var ise
- Bağırsakta iltihaplı bir durum var ise
- Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise
- Makat çevresinde çatlaklarınız, yara ve iltihap var ise

LAKSOTEK PEDIATRİK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Uzun süreli kullanımın bağırsak tembelliği ve su-elektrolit dengesi bozukluğu yapabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olanlarda özellikle dikkatli olunmalıdır.
- Bağırsak tıkanıklığı ya da tanısı henüz konmamış karın içi yakınmaları olan hastalara uygulanmamalı ve iltihabi (inflamatuvar) bağırsak hastalıklarında dikkatle kullanılmalıdır.
- Diabetes mellitus (şeker hastalığı) hipertansiyon (tansiyonda artış) ve kalp hastalığı bulunanlarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
- Supozituar kullanımı özellikle anal fissürü (makatta çatlağı) ve ülseratif proktiti (makatta iltihabi hastalığı) olanlarda acı hissine ve lokal irritasyona (uygulama bölgesinde tahrişe) sebep olabilir.
- 5 günden daha uzun süreyle devamlı kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAKSOTEK PEDIATRİK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolundan dolayı geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

Bu ilacı kullanırken baş dönmesi ya da halsizlik hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

LAKSOTEK PEDİATRİK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAKSOTEK PEDİATRİK içinde uyarı gerektiren bir madde bulunmamaktadır

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

- İdrar söktürücüler (bendrofluazit, furosemid gibi)
- Steroid ilaçlar (iltihabi hastalıkların tedavisinde kullanılan, örn. prednizolon gibi)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LAKSOTEK PEDİATRİK nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

4-10 yaş arası çocuklarda LAKSOTEK PEDİATRİK doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Genellikle 5 mg supozitivar anında etki için makattan (rektal yolla) uygulanır. Her gün için yalnızca 1 adet supozitivar kullanılır.

Ameliyat öncesi, röntgen ya da diğer testlerden önce bağırsak boşaltmada kullanılır. LAKSOTEK PEDİATRİK, en fazla 5 gün boyunca kullanılır.

Bu süre içinde belirtilerin (semptomların) kaybolmaması veya ağırlaşması durumunda doktora başvurunuz.

Kısa süreli kullanım içindir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Supozitivar (fital), eller iyice yıkanıp kurulandıktan sonra makat içine itilerek tatbik edilir ve en az 30 dakika boyunca içeride tutulur.

Bu ilaç en fazla 5 gün kullanılır. Bu süre içerisinde; eğer çocuğunuzun durumu kötüye gidiyorsa veya yeni belirtiler (semptomlar) meydana geliyorsa tedaviyi hemen durdurmalı ve doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

- **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanımı:**

LAKSOTEK PEDİATRİK, 4 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. 4-10 yaş arası çocuklarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

- **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır. 65 yaş üzeri için yapılan klinik araştırmalar sonucu bu yaş grubunda özel bir olumsuz etkiye rastlanmamıştır.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanım şekli bulunmamaktadır. Doktorunuza danışarak kullanınız.

Eğer LAKSOTEK PEDIATRİK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LAKSOTEK PEDIATRİK kullandıysanız:

Yüksek dozda kullanılması sonucunda; birdenbire nöbet tarzında gelen karın ağrısı (kolik) ve kramp gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, şişkinlik, tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve ishal görülebilir.

LAKSOTEK PEDIATRİK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LAKSOTEK PEDIATRİK'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LAKSOTEK PEDIATRİK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LAKSOTEK PEDIATRİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LAKSOTEK PEDIATRİK'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüzde ve boğazda ciddi alerjik reaksiyonlar
- Nefes almada güçlük veya baş dönmesi
- Deri döküntüsüne sebebiyet verebilen alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAKSOTEK PEDIATRİK'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.00 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın:

- Karında kramp ve ağrı
- İshal
- Bulantı

Yaygın olmayan:

- Dışkıda kan
- Kusma
- Karın rahatsızlığı
- Makat içerisinde ve çevresinde rahatsızlık
- Baş dönmesi

Seyrek:

- Kalın bağırsak iltihabı
- Su kaybı
- Bayılma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LAKSOTEK PEDİATRİK in saklanması

LAKSOTEK PEDİATRİK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2-4°C arasında buzdolabında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAKSOTEK PEDIATRİK'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LAKSOTEK PEDIATRİK'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34398 Maslak -İSTANBUL

Üretim Yeri:

Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34398 Maslak -İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.