

KULLANMA TALİMATI

MUKO-S FORT tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin maddeler:** Her tablet 375 mg karbosistein içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mısır nişastası, laktoz (sığır kaynaklı), PVP K-30, primojel, talk, aerosil, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MUKO-S FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MUKO-S FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MUKO-S FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MUKO-S FORT'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MUKO-S FORT nedir ve ne için kullanılır?

MUKO-S FORT, her bir tablette 375 mg karbosistein içeren, mukolitik etkili bir ilaçtır. MUKO-S FORT'ta yardımcı madde olarak bulunan laktoz sığır kaynaklıdır.

MUKO-S FORT, 20 ve 50 adet, beyaz tabletler halinde, PVC/Alüminyum folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

MUKO-S FORT, aşırı mukus oluşması ile karakterize akut ve kronik solunum yolu hastalıkları ile sekretuar orta kulak iltihabında (kulak nezlesi; orta kulakta yapışkan sıvı toplanması ile karakterize) yardımcı tedavi olarak kullanılır.

2. MUKO-S FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUKO-S FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Karbosistene ve/veya tabletin içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
- Mide veya duodenum (onikiparmak bağırsağı; ince bağırsağın bir bölümü) ülseriniz varsa

MUKO-S FORT'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer;

- Emziriyorsanız
- Gemiřinizde lser hikayesi varsa

Astımı olan hastaların tedavileri esnasında bronkospazm oluřabileceęinden dikkatli kullanılmalıdır. Belirtiler grlrse kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

MUKO-S FORT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

MUKO-S FORT yiyecek ve iecek ile birlikte kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamilelięin ilk  ayında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımına etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

MUKO-S FORT'un ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

MUKO-S FORT laktoz (sıęır kaynaklı) ierir. Eęer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduęu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Folkodin (opiat trevi ksrk kesici ila) ile geimsizdir. Folkodin ile karıřımı karbosisteinin okmesine neden olur. Opiat trevi bu tip bileřiklerle aynı anda kullanılmaması tavsiye edilir.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MUKO-S FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı iin talimatlar:

Başlangıç dozu günde 3 kez 2 fort tablet (toplam 2.250 mg).

İdame (devam ettirme) dozu ise, bölünmüş dozlar halinde günde toplam 1.500 mg'dır. Yeterli cevap elde edildikten sonra doz günde 2 kez 1 fort tablete kadar (toplam 750 mg) düşürülebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılır.

Karaciğer yetmezliği:

Yukarıda belirtilen dozlar kullanılır.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz MUKO-S FORT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

Eğer MUKO-S FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUKO-S FORT kullandıysanız:

MUKO-S FORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUKO-S FORT alırsanız, doktorunuzla konuşunuz veya hemen bir hastanenin acil bölümüne başvurunuz. İlaç paketini yanınıza alınız. Böylelikle doktorunuz ne kullandığınızı anlayacaktır. Çok fazla MUKO-S FORT kullanmışsanız mide rahatsızlığı yaşamanız muhtemeldir (gastrointestinal hastalık).

MUKO-S FORT'u kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUKO-S FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MUKO-S FORT ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşmaz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MUKO-S FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa MUKO-S FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyon (kızarıklık, yutma ya da nefes alma problemleri, dudaklarda, yüzde, boğazda ve dilde şişme)
- Dudaklarınızın, gözlerinizin, ağzınızın, burnunuzun ve cinsel organlarınızın çevresi de dahil olmak üzere cildinizde kabarcıklar veya kanama. Ayrıca grip benzeri belirtiler ve ateşe de sahip olabilirsiniz. Bu, 'Stevens-Johnson sendromu' adı verilen hastalık olabilir.
- Kusmukta kan ya da siyah renkli dışkı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Bilinmiyor

- Yüksek tansiyon
- Bulantı
- Baş ağrısı
- Kusma
- Burun kanaması
- Midede rahatsızlık
- İshal
- Ciltte döküntü
- Kan tükürme

Bunlar MUKO-S FORT'un zayıf yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

6. MUKO-S FORT’un saklanması

MUKO-S FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

MUKO-S FORT’u 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUKO-S FORT’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUKO-S FORT’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş
Davutpaşa cad. No. 12 (34473)
Topkapı / İSTANBUL

Üretim yeri:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş
Davutpaşa cad. No. 12 (34473)
Topkapı / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı ./../... tarihinde onaylanmıştır.