

KULLANMA TALİMATI

JİNOMED %2 Vajinal Krem

Deri yüzeyine uygulanır.

- **Etkin maddeler:** 1 g krem 20 mg fentikonazol nitrat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Xalifin 15, hidrojene lanolin (koyun yünü kaynaklı), setil alkol, gliseril monostearat II, propilen glkol, disodyum edetat, badem yağı ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***JİNOMED nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***JİNOMED'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***JİNOMED nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***JİNOMED'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. JİNOMED nedir ve ne için kullanılır?

JİNOMED, antifungal bir ajan olan fentikonazol nitrat aktif maddesini içerir.

JİNOMED belirli cins mantarların büyümesini engeller. Genital candidiasis (Genital pamukçuk) ve gram pozitif bakterilerin oluşturduğu vulvovajinit (dış genital organ ve vajinanın iltihabı) ve servisit (rahimin boyun kısmındaki bölgenin iltihabı) tedavisinde

etkilidir.

2. JİNOMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bu kullanma talimatında yer alan bilgilerden farklı bile olsalar doktorunuz tarafından size verilen tüm talimatları dikkatle izleyiniz.

JİNOMED’i kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

JİNOMED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Fentikonazol nitrat ya da imidazoller (örn. klotrimazol) olarak bilinen diğer benzer ilaçlara ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız var ise, JİNOMED kullanmayınız.

JİNOMED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

Kontrasepsiyon için kondom ya da diyafram gibi bir bariyer yöntemi kullandığınız sırada, JİNOMED’i kullanmayınız.

JİNOMED’i uyguladığınızda, hafif bir yanma hissedebilirsiniz ancak bu genellikle kısa sürede yok olur.

JİNOMED’i uzun süre kullanırsanız, ona karşı alerjik olabilirsiniz, bu durumda JİNOMED’i kullanmayı kesiniz.

Gebe iseniz doktorunuza danışmadan JİNOMED’i kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

JİNOMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

JİNOMED’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece bu ilaç kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece bu ilacı kullanmamanız önerilir. Emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

JİNOMED'in araç ve makine kullanımı üzerinde bildirilen bir etkisi yoktur.

JİNOMED'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Hidrojene lanolin (koyun yünü kaynaklı), bölgesel deri reaksiyonlarına (örneğin, temas ekzeması (kontakt dermatit)) neden olabilir.

Propilen glikol, deride tahrişe neden olabilir.

Setil alkol, bölgesel deri reaksiyonlarına (örneğin, temas ekzemasına (kontakt dermatite)) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kremin diğer ilaçlarla etkileşimi muhtemel değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. JİNOMED nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

JİNOMED, gece yatmadan önce (gerekirse sabahları da olmak üzere) vajinaya 3 gün süreyle uygulanır. Semptomlarınız hızlıca kaybolabilir, ancak kremi 3 gün boyunca kullanmaya devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Enfeksiyonun tekrarlanmasını önlenmesi amacı ile JİNOMED Krem'in penise (prepisium ve glans penis) lokal olarak uygulanarak, partnerin de aynı zamanda tedavi görmesi önerilir.

Bu işlemden sonra her zaman ellerinizi sabun ve sıcak suyla yıkayınız. JİNOMED yağlı değildir, leke yapmaz ve suyla kolayca temizlenir.

Eğer iyileşme gözlenmez ya da durum daha kötüleşirse, doktorunuza danışınız.

Eğer ürünün kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

JİNOMED'in çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer JİNOMED'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla JİNOMED kullandıysanız:

Eğer siz ya da bir başkası yanlışlıkla bir miktar JİNOMED yutarsanız hemen bir doktora başvurunuz.

JİNOMED'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

JİNOMED'i kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı kullanmayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz uygulayınız ve sonra dozları normal zamanında kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

JİNOMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, JİNOMED'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler ařağıdaki kategorilerde gösterildiğı şekilde sıralanmıřtır.

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastada birden az fakat 10.000 hastada birden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Uygulama bölgesinde hafif ve geçici kızarıklık ya da genellikle hızlıca kaybolan yanma hissi görülebilir. Bu yan etkiler çok seyrek olarak görülür.

Uzun süre JİNOMED kullanırsanız, buna karşı alerji geliřtirebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılařtığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduėunuz ilacın güvenliliğı hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı saėlamıř olacaksınız.

5. JİNOMED'in saklanması

JİNOMED'i *çocukların göremeyeceğı ve erişemeyeceğı yerlerde ve ambalajında saklayınız.* 25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra JİNOMED'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz JİNOMED'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaçları Ltd. Şti.
Bağcılar/İstanbul

Üretim yeri:

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Bağcılar / İstanbul

Bu kullanma talimatı 25.10.2019 tarihinde onaylanmıştır.