

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Capsicum frutescens</i> (L.) Kuntze İngilizce: African bird's eye, bird pepper, hot pepper, red chili, capsicum Türkçe: Acı kırmızıbiber Sinonimi (varsa):-
FAMİLYASI	Solanaceae
KULLANILAN KISMI	Kurutulmuş olgun meyveler
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Eldiven lateksine alerjisi olanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişmesi nedeniyle kullanılması önerilmez.</p> <p>Ülserde, mide inflamasyonunda ve kronik barsak inflamasyonu olanlarda kullanımından kaçınılmalıdır.</p> <p>Bitki tozu ve ekstresi solunmamalıdır.</p> <p>Açık yaralarda, egzemada kullanılmamalı ve göze uygulanmamalıdır.</p> <p>Toksik dozda hipotermi, uzun süre yüksek dozda kronik gastrit, böbrek ve karaciğer bozuklukları ile nörotoksik etkiler görülebilir.</p> <p>Tedavi esnasında güneş sıcak su ve diğer ısı kaynaklarının (termofor vb.) uygulanmasından kaçınılmalıdır.</p> <p>Kullanım esnasında belirtiler kötüleşirse bir hekim veya eczacıyla görüşülmelidir.</p> <p>2 günden daha uzun süreli uygulamalarından kaçınılmalı ve aradan 14 gün geçmeden yeni bir uygulama yapılmamalıdır.</p> <p>Ağrı devam ettiği sürece hekim kontrolünde 3 haftaya kadar tedaviye devam edilebilir ancak 3 haftalık kullanımdan sonra en az 2 haftalık bir ara verilmelidir.</p> <p>Diğer benzer amaçlı topikal ürünler ile aynı zamanda uygulanmaya yönelik değildir.</p> <p>Kullanım sırasında belirtiler devam ederse hekim veya eczacıya danışılmalıdır.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığından 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığından hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	ACE inhibitörleri, antikoagulanlar, barbitüratlar, teofilin ve salisilik asit türevleri ile etkileşim gösterir.

LITERATÜR

- 1) PDR, 2007
- 2) FFD, 2017
- 3) EMA, 2015