

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. emend. Lindm. İngilizce: Hawthorn Türkçe: Alıç, Beyazdiken, Edran, Ekşi muşmula, Enişen, Geviş, Gırgat, Koca karı yemişi, Öküz göbeği, Sürsülük, Yemişen, Yemişgen, Yemişken, Yemşen. Sinonimi (varsa): <i>Crataegus oxyacantha</i> L.
FAMİLYASI	Rosaceae
KULLANILAN KISMI	Çiçek, yaprak ve meyve
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Kullanım sırasında bacaklarda ödem oluşması; kalp, göğüs veya omuz civarında ağrı oluşması ya da dispne durumunda mutlaka hekime danışılmalıdır. Cerrahi girişimlerden 2 hafta önce kullanımı kesilmelidir. 2 haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Yüksek miktarda kullanıldığında sedasyon, aritmi, titreme, dispne, tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir. Yeterli veri mevcut olmadığı için, 12 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez. Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez. Kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Kardiyak glikozitler, vazodilatörler, beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, fosfodiesteraz-5 inhibitörleri ve nitratlar ile etkileşir.
LİTERATÜR	1) PDR, 2000 2) FFD, 2011 3) FFD, 2017 4) EMA, 2016 5) ESCOP Suppl., 2009 6) WebMD