

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Filipendula ulmariae</i> (L.) Maxim. İngilizce: Meadowsweet Türkçe: Çayır kraliçesi, Ergeç sakalı, Keçi sakalı, Teke sakalı Sinonimi (varsa): <i>Spirea ulmaria</i> L., <i>Filipendula denudata</i> (J.&K. Presl) Rydb.
FAMİLYASI	Rosaceae
KULLANILAN KISMI	Herba, Çiçekler
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Salisilat bileşiklerine hassasiyeti olan bireylerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebileceğinden kullanılmamalıdır.</p> <p>Uzun süreli kullanımı sonucunda gastrointestinal irritasyon, kabızlık, demir eksikliği anemisi ve beslenme bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu nedenle kanama problemi olan kişilerde de kullanılmamalıdır.</p> <p>Soğuk algınlığında 1 haftalık, eklem ağrılarında 4 haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Ateş 39°C'yi aşarsa, geçmezse, şiddetli baş ağrısıyla ilişkiliyse veya kullanımı sırasında belirtiler kötüleşirse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Solunum güçlüğüne neden olduğu gösterilmiş olduğundan, astımı olan kişilerde kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri bulunmaması nedeniyle 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Antikoagulan ilaçlarla, salisilatlar ve türevleriyle, non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
LİTERATÜR	1) The Complete German Commission E Monographs, 1998 2) EMA, 2011 3) FFD, 2017