

▼ Deferasiroks İçeren Suda Dağılabilen Tabletler ile Tedaviye İlişkin Hasta Kılavuzu

ADI SOYADI: _____

TARİH: _____

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen, yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Mutlaka tüm randevularınızı takip ediniz ve Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

İçindekiler

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler kılavuzunuz

* Giriş	3
* Deferasiroksun çeşitli formları.....	4
* Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler nedir?.....	5
* Neden bana deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler reçete edildi?	5
* Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler nasıl etki ediyor?	6
* Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler ne için kullanılır?	6
* Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri nasıl kullanmalıyım?.....	7
* Tedavim nasıl takip edilecek?	9
* Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin yan etkileri var mı?	10
* Başka ilaçlar ile birlikte kullanım	11
* Doğum kontrolü	12
* Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler ile kaydettiğim düzelme.....	12
* Hakkımdaki bilgiler.....	13
* Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlere başlarken	14

Giriş: Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler kılavuzunuz

Bu kılavuz size reçete edilen formülasyona bağlı olarak, deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin doğru kullanımı da dahil olmak üzere önemli bilgiler içermektedir. Bu kılavuzla size reçete edilen formülasyona bağlı olarak deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin doğru şekilde kullanımını ve ayrıca tedavinizin takibi, olası yan etkiler ve deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin tedavisi sırasında diğer ilaçların kullanımını öğreneceksiniz.

Film kaplı tablet versiyonu reçetesi, suda dağılabilen tabletlerden daha düşük bir dozda olacaktır. Eğer film kaplı tabletler için reçetenizde hekiminiz tarafından belirtildiği şekilde ayarlanmış daha düşük dozu almazsanız, almanız gerekenden daha fazla deferasiroks alabilirsiniz ve bu durumda doz aşımı advers reaksiyonları yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda, acilen doktorunuz bilgilendirin ya da acil servislerle iletişime geçin; çünkü tıbbi tedavi gerekli olabilir (bkz. sayfa 11). Ciddi olabilen karın ağrısı, ishal, mide bulantısı, kusma ve böbrek ya da karaciğer problemleri gibi etkiler yaşayabilirsiniz.

Deferasiroks farklı formlarda satışa sunulmuştur. Her birinin spesifik bir şekli ve rengi vardır ve farklı şekilde kullanılmaktadırlar

İlacınızı doktorunuzun söylediği şekilde almanız önemlidir.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler, beyaz ila açık sarı renkte, yuvarlak tabletlerdir. Sıvı içinde çözündürülerek aç karnına alınması gereken yuvarlak tabletlerdir. Günde 1 defa, aç karnına, yemekten en az 30 dakika önce, tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır.

Suda dağılabilen tabletler, bir bardak (100 – 200 ml) su veya portakal ya da elma suyuiçerisinde, ince bir süspansiyon meydana gelinceye kadar karıştırılarak eritilir. Süspansiyon içildikten sonra, bardakta kalabilecek herhangi bir artık, az miktarda su veya meyve suyuyla yeniden süspansiyon haline eritilerek içilmelidir. Tabletler çiğnenmemeli veya tüm olarak yutulmamalıdır.



Gösterilen tabletler gerçek boyutlarında değildir.

Film kaplı tabletlerden suda dağılabilen tabletlere geçiş yapıyorsanız, doz ayarlamasına ihtiyaç duyacaksınız. Doktorunuz ve eczacınız size doğru dozu önerecektir. Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler nedir?

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler, vücuttaki demir fazlasının atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle “demir şelatörü” veya “şelasyon ajanı” olarak bilinmektedir.

Neden bana deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler reçete edildi?

Kan transfüzyonları gerektiren çeşitli hastalıklar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdadır:

- Transfüzyona bağımlı beta-talasemi majör
- Orak hücreli anemi veya OHA
- Düşük riskli miyelodisplastik sendromlar veya MDS
- Diğer anemiler

Sizde bu rahatsızlıklardan biri varsa, size de muhtemelen birkaç defa kan transfüzyonu yapılmıştır. Kan transfüzyonları, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu düzeyde sağlıklı eritrositler içerir ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Size yapılan her kan transfüzyonu demir içermektedir. Eritrositler aracılığıyla vücudunuzda oksijenin taşınması için demir kullanılması nedeniyle, demir ayrı bir önem taşımaktadır. Ancak, vücut demir fazlasını kendiliğinden uzaklaştıramamaktadır.

Her transfüzyonla birlikte vücutta belirli bir miktarda demir birikir ve vücudunuzdaki bu ilave demir, **kronik aşırı demir yükü** olarak adlandırılan bir duruma yol açabilir. Aşırı miktarda demir tehlikeli olabilir ve kalp, karaciğer gibi organlarınıza zarar verebilir.

Vücudunuzdaki demiri sağlıklı ve güvenli bir düzeyde tutmak için bu demir fazlasının atılması gerekmektedir.

Deferasiroks ieren suda dađılabilen tabletler nasıl etki ediyor?

Deferasiroks ieren suda dađılabilen tabletler, “şelasyon” adı verilen bir iřlem aracılıđıyla etkisini gstermektedir.

Deferasiroks ieren suda dađılabilen tabletler yutulduktan sonra kana karıřır ve mevcut demir fazlasını “yakalar”.



Deferasiroks ieren suda dađılabilen tabletler ne iin kullanılır?

Deferasiroks ieren suda dađılabilen tabletler, kan naklinin sebep olduđu ařırı demir yklemesinin tedavisinde kullanılır. Yetiřkinlerin, genlerin ve 2 yař ve zerindeki ocukların tedavisinde kullanılabilir.

Deferasiroks ieren suda dađılabilen tabletler, talasemi sendromlarıyla iliřkili demir yklenmesi olan ancak kan nakli almayan hastaların tedavisi iin kullanılır. Bu durumdaki yetiřkinlerde adlesanlarda ve 10 yař ve zeri ocuklarda kullanılabilir.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri nasıl kullanmalıyım?

Hangi dozda almalıyım?

Reçete edilmiş deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet dozunuz; kilonuz, mevcut demir düzeyiniz, karaciğer ve böbrek fonksiyonunuz ve kan transfüzyonu sıklığınıza göre belirlenmektedir.

Farklı bir ilaçtan (örn. deferoksamin) deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlere geçiyorsanız, doktorunuz deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet dozunuzu daha önceki ilaçtan ne kadar aldığınıza dayalı olarak seçebilir.

Hangi tableti(tabletleri) kullanacağım?

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler, farklı tablet boyutlarında sunulmaktadır ve bazı durumlarda birden fazla tablet almanız gerekebilir. Doktorunuz her gün hangi boyuttaki (boyutlardaki) tabletlerden ne kadar almanız gerektiğini size söyleyecektir.



Tabletler gerçek boyutunda değildir.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri ne zaman kullanmalıyım?

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri günde bir defa ve her gün aynı saatte almanız gerekmektedir. Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin her gün aynı saatte alınması, tabletinizi ne zaman almanız gerektiğini hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri aç karnına alın ve aldıktan sonra en az 30 dakika geçmeden bir şey yemeyiniz.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri nasıl saklamalıyım?

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri, nemden korumak üzere orijinal ambalajında saklamanız gerekmektedir.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin kullanım adımları



1. Adım:

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletinizi (tabletlerinizi) bir bardak portakal suyu, elma suyu veya suyun içine ATINIZ. Deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet karıştırma şişesini de kullanabilirsiniz. Tam olarak doktorunuz tarafından belirtilen miktarda sıvı kullanmaya özen gösteriniz.

2. Adım:

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet (tabletler) tam olarak çözünene kadar **KARIŞTIRINIZ**. Bardak içindeki sıvı bulanık görünecektir ve karışım yoğun kıvamlı olabilir.

3. Adım:

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet karışımının tamamını tek seferde hemen İÇİNİZ. Bardakta kalan kısma biraz daha meyve suyu veya su ekleyin, sıvıyı bardak içinde döndürün ve bu sıvıyı da içiniz.

Tabletleri çiğnemeyin veya bütün olarak yutmayın. Tabletleri kırmayınız veya ezmeyiniz.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri gazlı içecekler veya süt içinde eritmeyiniz.

Bir doz almayı unutursam ne yapmalıyım?

Bir deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet dozunu almayı unuttuğunuz takdirde, üzerinden uzun bir süre geçmiş olsa dahi hatırladığınız anda o dozu alın. Bir sonraki dozunuzu almanız gereken saatte alın.

Unutulan tableti(tabletleri) telafi etmek üzere sonraki gün iki doz almayın.

Almam gerekenden daha fazla deferasiroks içeren suda dağılabilen tableti alırsam ne yapmalıyım?

Eğer çok fazla deferasiroks içeren suda dağılabilen alırsanız ya da birisi kazara tabletlerinizi alırsa, hemen tavsiyesini almak üzere doktorunuzu ya da hastaneyi arayın. Doktora tablet paketini gösterin. Acil Tıbbi tedavi gerekli olabilir. Ciddi olabilen karın ağrısı, ishal, mide bulantısı, kusma ve böbrek ya da karaciğer problemleri gibi etkiler yaşayabilirsiniz.

Tedavim nasıl takip edilecek?

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet esnasında düzenli olarak laboratuvar testleri yapılacaktır. Bu testler yoluyla tedaviye verdiğiniz yanıt takip edilecektir. Doktorunuz bu testlere göre deferasiroks dozunuzu artırabilir ya da azaltabilir.

Test	Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlere başlamadan önce	Ayda bir	Yılda bir
Demir Serum ferritini	√	√	
Böbrekler Serum kreatinini	√ Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlere başlamadan önce bu test iki defa yapılacaktır.	√ İlk ay boyunca ve doz değiştirildikten sonraki birinci ayda (formülasyon geçişleri dahil) haftada bir ve daha sonra ayda bir defa kontrol edilecektir.	
Kreatinin klirensi	√	√ İlk ay boyunca ve doz değiştirildikten sonraki birinci ayda (formülasyon geçişleri dahil) haftada bir ve daha sonra ayda bir defa kontrol edilecektir.	
Karaciğer fonksiyonu (Serum transaminazları, bilirubin, alkalin fosfataz)	√	√ İlk ay boyunca 2 haftada bir ve daha sonra ayda bir defa kontrol edilecektir.	
İdrar (İdrarda protein)	√	√	
Duyma ve görme	√		√
Kilo ve boy Çocuk ve ergen hastalar	√		√

Çocuk ve ergen hastalar : Beden gelişimi (örn., kilonuz, cinsel gelişiminiz ve yılda ne kadar büyüdüğünüz) değerlendirilir.	√		√
---	---	--	---

Dozunuzun azaltılması veya artırılması gerekebilir.

Doktorunuz ayrıca,

- Kalp veya karaciğerinizdeki demir düzeylerini kontrol etmek için manyetik rezonans görüntüleme (**MRG**) adı verilen bir yöntem kullanabilir.
- Böbrek problemlerinden şüpheleniyorsa, böbrek **biyopsisi** yapabilir.
- Diğer böbrek tübüler fonksiyon belirteçleri için testler (diyabetik olmayanlarda glikozüri ve düşük serum potasyum, magnezyum seviyeleri veya urat, fosfatüri, aminoasidüri gibi) gerekiyorsa yapılacaktır.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin yan etkileri var mı?

Her ilaç gibi deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin birtakım yan etkileri vardır. Ancak bu yan etkiler tüm hastalarda görülmez. Yan etkilerin çoğu hafif-orta şiddettedir ve genellikle tedaviye alıştıktan sonra ortadan kalkmaktadır. Yan etkilerin ortadan kalkması için birkaç gün ila birkaç hafta geçmesi gerekebilir.

Yaygın yan etkiler arasında; bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık gibi gastrointestinal bozukluklar, döküntü, baş ağrısı yer almaktadır.

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletlerin tedavisine başlamadan önce böbrek ve karaciğer fonksiyon testi yapılacak ve bu fonksiyonlar tedavi boyunca düzenli olarak takip edilecektir. (Önceki sayfadaki tabloya bakın)

Bazı yan etkiler ciddi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Bu yan etkiler seyrek veya nadiren görülmektedir. Aşağıdakilerden herhangi biri meydana geldiği takdirde, ilacı kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza başvurun:

- Şiddetli deri döküntüsü veya nefes alma güçlüğü ve baş dönmesi veya özellikle yüz ve boğazda şişme (şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri);
- Şiddetli deri döküntüsü, ciltte kızarıklık, dudaklar, gözler veya ağızda kabarcıklanma, yüksek ateş, grip benzeri semptomlar, lenf nodlarında büyüme (şiddetli cilt reaksiyonu belirtileri);
- Vücudun ürettiği idrar miktarında belirgin azalma (böbrek rahatsızlığı belirtisi)
- Kan kusma ve siyah dışkı;
- Bir arada görülen sersemlik, karnın sağ üst kısmında ağrı, cilt veya gözlerde sararma veya sararma artışı ve koyu renkli idrar (karaciğer rahatsızlığı belirtileri);
- Düşünme, bilgileri hatırlama ya da problem çözmede güçlük yaşıyorsanız, dikkat ya da farkındalığınızda azalma varsa ya da düşük enerji ile birlikte kendinizi uykulu hissediyorsanız (karaciğer ya da böbrek problemleri ile ilişkili olabilen ve beyin fonksiyonunuzda değişikliğe neden olabilen, kanınızda yüksek düzeyde amonyak olduğuna dair potansiyel belirtiler)
- Özellikle yemek yedikten veya deferasiroks aldıktan sonra görülen sık karın ağrısı;

- Şiddetli üst mide ağrısı;
- Sık sık mide yanması;
- Kısmi görme kaybı

Unutmayınız: Her türlü yan etkiyi mutlaka doktorunuza bildirin. Ciddi yan etki meydana gelmesi durumunda ilacı kullanmayı BIRAKINIZ ve hemen doktorunuza başvurunuz.

Yan etkiler ve ciddi yan etkiler hakkında daha detaylı bilgi için Hasta Kullanma Talimatı'na bakın.

Yan Etkilerin Bildirimi:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Başka ilaçlarla birlikte kullanılabilir mi?

Başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız, bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyin. Bu durum reçetesiz ilaçlar için de geçerlidir. Doktorunuz bu ilaçların etkisini takip etmek üzere laboratuvar tetkikleri isteyebilir.

Doktorunuza bildirmeniz gereken önemli ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

- Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler ile birlikte alınmaması gereken diğer demir şelatörleri
- Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler ile günün aynı zamanında kullanılmaması gereken alüminyum dahil olmak üzere antasitler (mide ekşimesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- Siklosporin (vücudun nakledilen bir organı reddetmesini önlemek için veya romatoid artrit veya atopik dermatit gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
- Simvastatin (kolesterolü düşürmek için kullanılır)
- Belirli ağrı kesiciler veya iltihap giderici (anti-enflamatuar) ilaçlar (örn. aspirin, ibuprofen, kortikosteroidler)
- Ağızdan alınan (oral) bisfosfonatlar (kemik erimesi (osteoporoz) tedavisinde kullanılır)
- Kan pıhtılaşmasını önleyici (antikoagülan) ilaçlar
- Hormonal kontraseptif ajanlar (doğum kontrol ilaçları)
- Beprihidil (kalp problemleri ve migrenlerin tedavisinde kullanılır)
- Ergotamin (migren tipi baş ağrısı tedavisinde kullanılır)
- Repaglinid (diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılır)
- Rifampisin (tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılır)
- Fenitoin, fenobarbital, karbamazepin (sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır)
- Ritonavir (HIV enfeksiyonu (AIDS hastalığı) tedavisinde kullanılır)
- Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılır)
- Teofilin (astım gibi solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
- Klozapin (şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılır)

- Tizanidin (kas gevşetici olarak kullanılır)
- Kolestiramin (kanda kolesterol seviyesi düşük olduğunda kullanılır)
- Midazolam (yatıştırıcı olarak, anksiyete ve amnezi tedavisinde kullanılır)
- Busülfan (nakilden önce orijinal kemik iliğinin yok edilmesi amacıyla nakil öncesi bir tedavi olarak kullanılır)

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler ile kaydettiğim düzelme

Tedavi hedefim

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler ile tedavinin amacı, vücudunuzdaki demiri sağlıklı bir düzeyde tutmaktır. **Tedavi hedefinize** ulaşma yolunda kaydettiğiniz düzelmeyi takip etmek üzere her ay doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Doktorunuz serum ferritini ya da **SF** testi adı verilen bir kan testine dayanarak tedavi hedeflerinizi belirleyecektir. Bu test doktorunuza vücudunuzda ne kadar demir olduğunu göstermektedir. Doktorunuz SF düzeyinizi düşürmek isteyebilir veya mevcut düzeyde tutabilir.

Deferasiroks dozum

Doktorunuz SF düzeyi, diğer laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlar veya kan transfüzyonu sıklığınıza bağlı olarak dozunuzu değiştirmeye karar verebilir.

3-6 ay boyunca deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletleri aldıktan sonra planlanan şekilde düzelme gösterip göstermediğinizi görmek üzere doktorunuza başvurun. Planlanan şekilde düzelme göstermiyorsanız, doktorunuza tedavi hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak planla ilgili sorular sorun.

Her doktor ziyareti arasında

Doktor ziyaretleri arasında başka önemli olaylar meydana gelebilir. Bu olayları kaydetmeli ve doktorunuza bildirmelisiniz. Bu olaylar arasında şunlar yer almaktadır:

- Yan etkiler
- Birlikte kullanmaya başlayacağınız başka ilaçlar
- Reçete edilen dozdan tüm sapmalar

Doğum Kontrolü:

Halihazırda gebeliği önlemek için bir oral kontraseptif veya bir flaster kontraseptif kullanıyorsanız, ilave ya da farklı bir doğum kontrol yöntemi (örn., prezervatif) kullanmalısınız; çünkü deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler, oral ve flaster kontraseptiflerin etkililiğini azaltabilir.

Hasta hakkında ön bilgi

Sizinle ilgili ön bilgiler, deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler tedavisi planlanırken hem size hem de doktorunuza yardımcı olacaktır. Bu soruları yanıtlarken yardıma ihtiyacınız olursa, doktorunuza başvurun.

Genel bilgiler
Adı:
Soyadı:
Doğum tarihi:
Tanı:

Size hiç kan transfüzyonu yapıldı mı? Yapıldıysa, kaç defa ve ne sıklıkta yapıldı?

Başka bir sağlık sorunuz var mı?

Şu anda başka bir sağlık sorunu nedeniyle herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz?

Alerjiniz var mı?

Deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler başlarken

Doktorunuz hedeflenen SF düzeyinize ve deferasiroks dozunuza karar verdikten sonra kaydettiğiniz düzelmeyi takip etmeye başlayabilirsiniz. Aşağıda yer alan tedavi hedefleri ve diğer bilgiler bölümünü doktorunuzla birlikte doldurun.

Tarih: _____	Mevcut SF düzeyim: _____
---------------------	---------------------------------

Tedavi hedefim:	Deferasiroks doz rejimim:
SF düzeyimi _____ düzeyine düşürmek	<ul style="list-style-type: none">• Bana deferasiroks içeren film kaplı tablet mi reçete edildi? Suda dağılabilen tablet mi reçete edildi? <input type="checkbox"/> Deferasiroks içeren film kaplı tablet <input type="checkbox"/> Deferasiroks içeren suda dağılabilen tablet
Kilom: _____	<ul style="list-style-type: none">• Dozum nedir? _____• Her gün kaç tablet alacağım? _____• Eğer deferasiroks içeren suda dağılabilen tabletler kullanıyorsam ne kadar sıvıya karıştırmalıyım? _____• İlacımı her gün saat kaçta alacağım? _____

Notlar: Doktorunuzla yaptığınız görüşmeye ait notlarınızı veya sorularınızı buraya yazın.
--

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen, yeni güvenilirlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Mutlaka tüm randevularınızı takip ediniz ve Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.