

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Hypericum perforatum</i> L. İngilizce: St. John's Wort Türkçe: Sarı kantaron , Binbirdelikotu , Kanotu Sinonimi (varsa): <i>Hypericum assurgens</i> Peterm. ex Rouy, <i>Hypericum lineolatum</i> Jord.
FAMİLYASI	Hypericaceae (Guttiferae)
KULLANILAN KISMI	Çiçekli topraküstü kısımları ve sabit yağda çiçeklerinden hazırlanan yağı
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	Aktif bileşenlere karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Dahilen veya haricen tedavi sırasında yoğun güneş ışığından kaçınılmalıdır. Ciltte infeksiyon belirtileri gözlenirse hekime danışılmalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda haricen, 18 yaş altındakilerde dahilen kullanımı önerilmez. Organ nakli operasyonlarından 2 ay önce kullanımı kesilmelidir. Kullanımı sırasında mide ve barsakta rahatsızlık, alerjik cilt reaksiyonları oluşabilir, yorgunluk ve huzursuzluk hissedilebilir. Bir haftalık kullanım süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Yeterli veri olmadığından gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 ile metabolize olan ve P-glikoprotein substratları, oral kontraseptifler, genel ve lokal anestezipler, antidepresanlar ve teofilin ile etkileşebilir.
LİTERATÜR	1) EMA, 2009 2) EMA, 2018 3) PDR, 2000 4) FFD, 2011 5) WebMD