

<p style="text-align: center;">Ranolazin Hasta Uyarı Kartı</p> <p>(Bu kartı her zaman yanınızda bulundurunuz)</p> <p style="text-align: center;"><u>Hasta için bilgi</u></p> <p>Bu kart, ranolazin ile tedaviden önce ve ranolazin ile tedavi sırasında bilmeniz gereken önemli güvenlik bilgilerini içermektedir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bu kartı, tedavinizle ilgilenen her doktora gösteriniz. <p><u>Ranolazin tedavisinden önce</u></p> <p>Eğer sizde aşağıdakilerden biri varsa, ranolazin almadan önce doktorunuzla konuşunuz:</p> <ul style="list-style-type: none">• Böbreklerinizde problem varsa• Karaciğerlerinizde problem varsa• Daha önce anormal bir elektrokardiogram (EKG) sonucunuz varsa• Epilepsi, bakteriyel ya da fungal enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonu, depresyon ya da kalp ritim bozukluğu tedavisi için ilaç alıyorsanız• Bitkisel ilaç: Sarı kantaron (St John's Wort) alıyorsanız• Alerji ilaçları alıyorsanız• Kolesterol düşürücü ilaçlar alıyorsanız• Organ nakli reddi riskini azaltmak için ilaç alıyorsanız	<p style="text-align: center;"><u>Ranolazin ile tedavisi sırasında</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ranolazin alırken Greyfurt Suyu içmeyiniz.• Ranolazin başladıktan sonra, baş dönmesi veya mide bulantısı hissederseniz, beklenmedik bir semptom ya da hastalık yaşarsanız doktorunuzu arayınız. <p>Ranolazin tedavi tarihi: Başlangıç.....</p> <ul style="list-style-type: none">• Daha fazla bilgi için kullanma talimatına bakınız.• Sağlık uzmanına yaptığımız ziyaretlerde kullanmakta olduğunuz diğer tüm ilaçlarınızın listesine sahip olduğunuzdan emin olunuz. <p>Hastanın adı</p> <p>Doktorun adı</p> <p>Doktorun telefonu.....</p> <p><u>Yan etkilerin raporlanması</u></p> <p>Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığımız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.</p>
--	---

<p>Ranolazin Hasta Uyarı Kartı (Sağlık Uzmanları İçin Bilgi)</p> <p>Bu kartı taşıyan hasta, semptomatik angina pektoris için ranolazin ile tedavi edilir.</p> <p>Dikkate alınması gereken potansiyel ilaç etkileşimleri olabileceğinden, bu hastaya herhangi bir ilaç reçetelemeden önce ilacın KÜB'ne bakınız.</p> <p><u>Ranolazin, aşağıdaki ilaçları alan hastalarda kontrendikedir:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Potansiyel CYP3A4 inhibitörleri (örneğin itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol, HIV proteaz inhibitörleri, klaritromisin, telithromisin, nefazodon)• Amiodaron dışında Sınıf Ia (örn. kuinidin) veya Sınıf III (örn., dofetilid, sotalol) antiaritmikler	<p><u>Asağıdaki ilaçlar ile kombinasyon halinde ranolazinin dozunun azaltılması gerekebilir:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Orta düzeyli CYP3A4 inhibitörleri (örn. diltiazem, eritromisin, flukonazol)• P-gp inhibitörleri (örn. siklosporin, verapamil) <p><u>Ranolazini hastalara reçete ederken dikkatli olunmalıdır:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ürün bilgilerinde adı geçen diğer bazı ilaçların alınması• Ürün bilgilerinde listelenen diğer bazı risk faktörleri <p>Hastaya, diğer reçeteli ilaçlar ile etkileşim potansiyeli hakkında bilgi veriniz ve baş dönmesi, mide bulantısı veya kusma durumunda hastanın doktoru ile iletişime geçiniz.</p> <p>Diğer öneriler için lütfen Kısa Ürün Bilgisi'ne bakınız.</p>
---	---

Not: Hasta uyarı kartı ürün ambalajından çıkacağı için "Ranolazin" yazılı yerlerde ilacın ticari ismi kullanılabilir.