

BITKİNİN ADI	Latince: <i>Serenoa repens</i> (W.Bartram) Small İngilizce: Saw palmetto, Sabal Türkçe: Cüce Palmiye Sinonimi(varsa): <i>Sabal serrulata</i> (Michx.) Schult.f., <i>Brahea serrulata</i> (Michx.) H.Wendl., <i>Corypha repens</i> W.Bartram
FAMİLYASI	Arecaceae
KULLANILAN KISMI	Meyveleri
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Karaciğer hastalarında kullanılmamalıdır.</p> <p><math>\alpha</math>-adrenerjik reseptörleri bloke edebilir.</p> <p>INR değerlerinde artışa yol açabilir.</p> <p>Hastalar kullanmadan önce ürolojik ve tıbbi değerlendirmeden geçmiş olmalıdır.</p> <p>Gastro-intestinal bozukluklar (bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı), baş ağrısı oluşabilir.</p> <p>Cerrahi operasyondan 2 hafta önce kullanımı kesilmelidir.</p> <p>Katarakt ameliyatında kullanılmamalıdır.</p> <p>Kullanımı sırasında şikâyetler kötüleşirse, ateş, spazm, idrarda kan, ağrılı idrara çıkma veya idrar retansiyonu gibi durumlarda hekime başvurulmalıdır.</p> <p>İki aydan fazla kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, 18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri olmaması sebebiyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.</p> <p>Tıbbi ürünün kullanımı sırasında belirtiler devam ederse bir hekime danışılmalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Antikoagulanlar/ antiplateletler, $\alpha$ -adrenerjik reseptör blokörleri, oral kontraseptifler ve östrojen ile etkileşir.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none"><li>1) EMA, 2015</li><li>2) PDR, 2000</li><li>3) FFD, 2011</li><li>4) ESCOP, 2003</li><li>5) WebMD</li></ol>