

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Taraxacum officinale</i> Weber ex Wiggers. İngilizce: Dandelion Türkçe: Karahindiba Sinonimi (varsa): <i>Leontodon taraxacum</i> L., <i>Taraxacum dens-leonis</i> Desf., <i>Taraxacum retroflexum</i> H. Lindb.
FAMİLYASI	Asteraceae
KULLANILAN KISMI	Kök, toprak üstü kısımları ve yaprakları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Safra kanalının kapanmasına, safra tıkanmasına, bağırsak tıkanmasına neden olabilir. Aktif peptik ülser ve karaciğer rahatsızlığı olan hastalar kullanmamalıdır.</p> <p>Ateş, disüri, spazmlar veya idrarda kan görülürse kullanımı hemen bırakılmalı ve bir hekime danışılmalıdır.</p> <p>Kullanım sonrasında elektrolit kaybına bağlı olarak kardiyak aritmilere neden olabilir.</p> <p>Diyabet hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.</p> <p>Asit fazlalığına yol açarak mide ağrıları yapabilir.</p> <p>Karaciğer üzerinde zararlı etkiler ve bazı ilaçların yarılanma süresinde artış beklenebilir.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri olmaması nedeniyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.</p> <p>İki ay kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	CYP1A2 ile metabolize olan ve karaciğerde glukuronidasyona uğrayan ilaçlarla, amaroid içeren ilaçlarla, tiazidler, bazı diüretikler, kinolon grubu antibiyotiklerle, lityumla, potasyumla ve spironolakton ile etkileşir.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none">1) FFD, 20112) Herbal Medicine, 20003) ESCOP, 20034) PDR, 20005) EMA, 20096) WebMD