

## Zostex (Brivudin) Hasta Uyarı Kartı

### **Bu kartı, tedavinin bitmesinden 4 hafta sonrasına kadar her zaman yanınızda taşıyın**

Bu kart, Zostex almadan önce ve/veya Zostex ile tedavi sırasında bilmeniz gereken önemli güvenilirlik bilgilerini içerir.

Bu kartı, başka herhangi bir tıbbi ürün kullanmadan önce ziyaret ettiğiniz her doktora ve eczacıya gösterin.

**⚠ DİKKAT: Zostex (brivudin) ile belirli kemoterapötik ilaçlar (örn. kapesitabin, 5-florourasil, tegafur vb.) veya flusitozin içeren antifungal ilaçlar arasındaki ETKİLEŞİM POTANSİYEL OLARAK ÖLÜMCÜLDÜR.**

Yakın zamanda belirli kanser kemoterapilerinden birini (örn. kapesitabin, 5-florourasil, tegafur vb.) veya topikal (harici) 5-florourasil almış veya halihazırda almakta olan ya da almayı planlayan (4 hafta içinde) hastalarda veya yakın zamanda flusitozin içeren antifungal tedavi almış ya da halihazırda almakta olan, mantar enfeksiyonu bulunan **hastalarda Zostex KULLANILMAMALIDIR.**

### **Zostex tedavisinden önce**

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, Zostex almadan önce doktorunuzla konuşun:

- yakın zamanda kanser kemoterapisi (özellikle kapesitabin, 5-florourasil (FU) veya diğer floropirimidinler) aldıysanız veya halihazırda alıyorsanız ya da almayı planlıyorsanız (4 hafta içinde)
- mantar enfeksiyonunuz varsa ve yakın zamanda flusitozin içeren antifungal tedavi aldıysanız veya halihazırda alıyorsanız
- yakın zamanda bir floropirimidin grubu (5-florourasil veya benzeri) içeren bir siğil ilacı veya aktinik keratoz veya Bowen hastalığına karşı bir ilaç kullandıysanız veya şu anda kullanıyorsunuz ya da kullanmayı planlıyorsanız
- bağışıklık sisteminiz (vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savunması) ciddi şekilde

## **Zostex (brivudin) tedavisi sırasında ve sonrasında**

• Kemoterapi (ağızdan veya enjeksiyon yoluyla alınan ya da lokal olarak krem, merhem, göz damlası veya başka bir ilaç formunda harici olarak uygulanan kemoterapi) ya da flusitozin içeren antifungal tedavi almanız gerektiğinde, son dört hafta içinde brivudin kullandığınızı veya kullanmakta olduğunuzu doktorunuza bildirin.

• Zostex ile tedaviye başladıktan sonra baş dönmesi veya mide bulantısı hissederseniz, hastalanırsanız veya beklenmedik semptomlar yaşarsanız doktorunuzu arayın.

Mide bulantısı; ishal; ağız ve/veya ağız içini örten dokuda iltihap; halsizlik, enfeksiyonlara karşı duyarlılıkta artış, yorgunluk; vücut genelinde düz kırmızı döküntü ve cildin dokununca acıması ile ardından derinin geniş alanlarında soyulmaya yol açan büyük su toplamaları olduğu takdirde, tedavi için derhal hastaneye gidin.

Kendinizi sistemik enfeksiyonlardan ve vücudunuzun susuz kalmasından koruyun.

Brivudin tedavisi:

Başlangıç.....

Bitiş.....

Zostex alımından sonra bekleme süresi:

Zostex	1.Haf ta	2.Haf ta	3.Haf ta	4.Hafta
Floroprimidinlerin ölümcül toksisitesi				

Daha fazla bilgi için bkz. Zostex kullanma talimatı.

Sağlık uzmanına yaptığınız her ziyarette diğer tüm ilaçlarınızın bir listesini yanınızda bulundurun.

Hasta Adı.....

Doktor Adı.....

Doktorun Telefon Numarası.....

bozulmuřsa; 6rneęin, yakın zamanda ařaęıdaki  
ilaçları aldıysanız veya halihazırda alıyorsanız:  
o kanser ilaçları (kemoterapi) veya  
o immünosüpresan ilaçlar (baęıřıklık sisteminizin  
fonksiyonunu baskılayan veya azaltan ilaçlar)