

KULLANMA TALİMATI

PALİGİS 9 mg uzatılmış salımlı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 1 tablet 9 mg Paliperidon içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz 102, hipromelloz 2208, amonyum metakrilat kopolimer tip B, sodyum lauril sülfat, bütül hidroksi toluen(E321), etanol, magnezyum stearat, opadry II white OY-LS-28908, amonyum metakrilat kopolimer tip A, trietil sitrat, Opadry II orange 02F230005, metakrilik asit- etil akrilat kopolimer, propilen glikol, titanyum dioksit, laktoz monohidrat, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***PALİGİS nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***PALİGİS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***PALİGİS nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***PALİGİS 'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. PALİGİS nedir ve ne için kullanılır?

- PALİGİS 9 mg uzatılmış salımlı tabletlerin her biri 9 mg paliperidon içerir.
- PALİGİS antipsikotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkilidir.
- PALİGİS 28 tabletlik formu ile kullanıma sunulmaktadır.

- PALİGİS şizofreni tedavisi için reçete edilmektedir. Şizofreni bir tür psikiyatrik hastalıktır.
- PALİGİS şizoafektif bozukluğun (duygu durum ve ruhsal denge bozukluklarının d6nemsel olarak tekrarlamasıyla tanımlanan bir t6r psikiyatrik hastalık) tedavisi i7in tek başına ve depresyona/ruhsal 76k6nt6ye karşı etkili ila7 ve/veya duygu durum d6zenleyiciler ile kombine olarak reçete edilmektedir.

2. PALİGİS'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

PALİGİS'i ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eđer Paliperidon'a veya PALİGİS'in i7erdiđi diđer yardımcı maddelere karşı ařırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız) ya da risperidon gibi benzer bir ilaca karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

PALİGİS'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Paliperidon ile tedavi edilen řizoafektif bozukluđu olan hastalar, maniden (tařkınlık n6beti) depresif belirtilere ge7iř potansiyeli bakımından dikkatle izlenmelidir.
- Bilinen kalp hastalıđınız veya QT uzaması (EKG isimli tetkik ile saptanan ve kalpte ciddi aritmilere ve ani 6l6mlere yol a7abilen bir durum) ile ilgili aile hikayeniz varsa
- Daha 6nce size y6ksek ateř ve kas sertliđi ile karakterize bir hastalık (N6roleptik Malign Sendrom) teřhisi konmuřsa,
- Daha 6nce size dil veya y6z6n anormal hareketleri ile karakterize bir hastalık (Tardif Diskinezi) teřhisi konmuř ise
- Ge7miřte beyaz kan h6crelerinizin d6ř6k seviyelerde olduđunu biliyorsanız (buna diđer ila7lar da sebep olmuř olabilir veya olmayabilir).
- řeker hastalıđınız veya řeker hastalıđına yatkınlıđınız varsa
- Kalbinizle ilgili bir hastalıđınız varsa veya sizi kan basıncınızın d6řmesine eđilimli yapacak bir kalp hastalıđı tedavisi alıyorsanız
- N6bet ge7irme hikayeniz varsa
- Yutma bozukluđunuz veya yemeđin dıřkıınıza ge7mesini zorlařtıracak mide veya bađırsak bozukluđunuz varsa
- İřhal ile iliřkili hastalıklar varsa
- Parkinson Hastalıđı veya Demans (bunama) varsa
- Uzun s6reli ađrılı sertleřmeniz (ereksiyon) varsa
- V6cut sıcaklıđınızı kontrol etmede g67l6k yařıyorsanız ya da v6cudunuz 7ok sıcaksa,
- B6brek yetmezliđi veya karaciđer yetmezliđiniz varsa
- Kanınızda prolaktin (kanda s6t hormonu) hormon seviyeleri anormal olarak y6ksekse ya da muhtemel bir prolaktin (kanda s6t hormonu) bađımlı t6m6r6n6z varsa,

- Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkilendirilmektedir)
- Hiperprolaktinemi (süt salgılatan hormonun kanda artması) varsa
- Ortostatik hipotansiyon (ani ayağa kalkma ile olan tansiyon düşüklüğü) varsa
- Normal gece uykusunda kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadığınız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar).

Bu ilaç bunaması olan yaşlı hastalarda çalışılmamıştır. Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen ve bunaması olan yaşlı hastalarda inme veya ölüm riskinde artış meydana gelebilir (Bkz Bölüm 4. Olası yan etkiler).

Kanınızda enfeksiyonla mücadele için gerekli belli bir tip beyaz kan hücresinin tehlikeli olarak düşük sayıda olması PALİGİS hastalarda çok nadir görülmüştür. Doktorunuz beyaz kan hücre sayınızı kontrol etmek isteyebilir.

PALİGİS kilo almanıza neden olabilir. Önemli derecede kilo alma durumu sağlığınıza olumsuz etkileyebilir. Doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol etmelidir.

PALİGİS alan hastalarda, şeker hastalığı ya da önceden var olan şeker hastalığının kötüleşmesi görülmüştür. Doktorunuz yüksek kan şekeri belirtilerinizi kontrol etmelidir. Daha önceden şeker hastalığı var olan şeker hastalarında kan glukozu düzenli olarak izlenmelidir.

Gözünüzde katarakt operasyonu sırasında, pupilla (gözünüzün ortasındaki siyah halka-gözbebeği) boyutunda olması gerektiği gibi artış olmayabilir. İris (gözün renkli kısmı) de ameliyat sırasında göze zarar verebilecek şekilde gevşek olabilir. Eğer bir göz operasyonu planlıyorsanız, bu ilacı alırken doktorunuza bilgi verdiğinizden emin olunuz.

Katarakt ameliyatı sırasında göz problemleri de meydana gelebilir. Eğer PALİGİS alıyorsanız ya da aldıysanız, katarakt ameliyatı sırasında “*Intraoperatif Floppy Iris Sendromu*” (IFIS) adı verilen bir durum oluşabilir. Eğer katarakt ameliyatı olmanız gerekli ise, bu ilacı alıp almadığınız konusunda göz doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olunuz.

PALİGİS, merkezi sinir sistemi (metilfenidat gibi psikostimulanlar) aktivitesini artıran ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PALİGİS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PALİGİS kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

- Eđer hamile iseniz ya da hamile olmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce tavsiyeleri için doktorunuza veya eczacınıza danıřınız. Hamileliđiniz sırasında doktorunuza danıřmadan bu ilacı kullanmamalısınız. Eđer hamileliđinizin son üç ayında (paliperidon) kullandıysanız, yeni dođanlarda dođumu takiben řiddeti deđiřebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevřeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eđer bebeđiniz bu belirtilerin herhangi birini geçirirse, doktorunuzla iletiřim kurunuz.
- PALİGİS yararları risklerinden daha yüksek olmadığı sürece gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

Emzirme

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Bu ilacı kullanırken bebeđinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaçla tedavi sırasında bař dönmesi ve görme problemleri meydana gelebilir (Bkz. Bölüm 4 Olası yan etkiler). Araç ve makine kullanımı gibi tam uyanıklık gereken durumlarda bu düşünölmelidir.

PALİGİS'in içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PALİGİS bütöl hidroksitoluen (E321) içermesine rađmen uygulama yolu nedeniyle uyarı gerekmemektedir.

PALİGİS her dozunda 200 mg/kg'dan az propilen gliköl ihtiva eder; yani esasında propilen gliköl içermez.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilaç, kalp ritmini kontrol eden belirli kalp ilaçları veya bazı diđer tipteki ilaçlar, alerji nedeniyle alınan antihistaminik ilaçlar, sıtma tedavisinde kullanılan antimalaryal ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan diđer antipsikotikler ile birlikte alındıđında kalpte elektriksel fonksiyon anormallikleri (ritim bozuklukları vb.) görülebilir.

Bu ilaç primer (öncelikli) olarak beyine etki ettiđi için beyine etki eden diđer ilaçların (ya da alkolün) müdahalesi beyin fonksiyonlarında additif etkilere (istenmeyen yan etki artışına) neden olabilir.

Bu ilaç kan basıncını düşürdüđü için, diđer kan basıncını düşüren ilaçlarla birlikte kullanırken dikkat edilmelidir.

Bu ilaç Parkinson hastalıđına ve huzursuz bacak sendromuna karřı kullanılan (örneđin; levadopa) ilaçların etkilerini azaltabilir.

Eğer bağırsakta hareketin hızını etkileyen ilaçlar alıyorsanız (ör metoklopramit), bu ilacın etkileri de etkilenebilir.

Bu ilaç, duyu durum dengeleyici olarak kullanılan valproat ile birlikte alınıyorsa doz azaltılması düşünülmelidir.

Bu ilacın oral risperidon (başka bir antipsikotik) ile birlikte kullanılması iki ilacın birlikte alınmasının yan etkilerin artışına yol açmasından dolayı tavsiye edilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PALİGİS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz günde bir kez sabahları 6 mg'dır; fakat doz, şizofreni için günde 3–12 mg doz aralığında veya şizoafektif bozukluk için günde 6-12 mg doz aralığında doktorunuz tarafından artırılabilir veya azaltılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

PALİGİS'i sabahları kahvaltı ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak PALİGİS'i her sabah aynı şekilde almaya dikkat ediniz.

PALİGİS'i ağız yoluyla alınız, bütün olarak bol su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

Aktif madde paliperidon yutulduğunda çözünmektedir ve bazen tablet kabuğu dışkıda görülebilir. Bu normal bir durumdur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

PALİGİS'in şizofreni tedavisi için 15 yaş ve üzerindeki ergenlerde tavsiye edilen dozu günde bir kez, sabahları 3 mg'dır.

51 kg ve 51 kg'nin üzerindeki ergenler için maksimum günlük doz 6 mg ila 12 mg aralığında yükseltilebilir.

51 kg'den az olan ergenlerde, maksimum günlük doz 6 mg'a yükseltilebilir.

PALİGİS'in 12 yaşın altındaki şizofreni hastalarında ve 18 yaşın altındaki şizoafektif bozukluk hastalarında güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Ne kadar ilaç kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir. Aldığınız miktar ilacın sizin için ne kadar işe yaradığına bağlıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları azalabileceğinden, böbrek fonksiyon durumuna göre doz ayarlaması gerekebilir.

Özel kullanım durumları**Böbrek yetmezliği**

Doktorunuz böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak bu ilacın dozunu ayarlayabilir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. PALİGİS ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmadığından bu hastalarda kullanılırken dikkatli olunması önerilmektedir.

Eğer PALİGİS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PALİGİS kullandıysanız

PALİGİS'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bu durumda sersemlik, uyuşukluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma ve yürümede problemler, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve kalp atışlarınızda anormallik görülebilir.

PALİGİS'i kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozdan sonraki gün bir sonraki dozunuzu alınız.

Eğer iki veya daha fazla doz almayı unutursanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PALİGİS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PALİGİS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PALİGİS kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kan damarlarından akciğerlere hareket eden, göğüs ağrısı ve solunumda güçlüğe neden olan, damarlarda özellikle bacaklarda kan pıhtılaşması durumu (bacaklarda şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi belirtileri içeren)
- Bunama ve zihinsel durumda ani bir değişiklik varsa ya da ani güçsüzlük ya da yüzde, kollarda, bacaklarda, özellikle bir tarafta, ya da kısa bir süre için bile olsa konuşma bozukluğu varsa bunlar inme işaretleri olabilir.
- Ateş, kas sertliği, terleme ya da bilinç kaybı (bu durum Nöroleptik Malign Sendrom olarak adlandırılır) ile seyreden bir duruma dair bulgular hissederseniz
- Erkeklerde uzun süren ya da ağrılı ereksiyon (bu durum priapizm olarak adlandırılır)
- Dil, ağız ve yüzde istemsiz ritmik hareketler

Ateş, ağızda şişkinlik, yüz, dil ve dudaklarda şişlik, nefes darlığı, kaşıntı, ciltte oluşan kızarıklıklar, bazen düşük kan basıncı ile karakterize alerjik reaksiyonlar olabilir (anafilaktik reaksiyonlar-Ani gelişen, ölümcül olabilen aşırı duyarlılık tepkisi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

- Uykuya dalmada veya uykuda kalmada güçlük
- Baş ağrısı

- Parkinsonizm: Hareketlerde yavaşlama veya bozulma, kaslarda sertlik veya gerginlik hissi (hareketleri sarsıntılı yapma) ve bazen dona kalma ve sonra yeniden başlama hareketleri. Diğer belirtileri; ayak sürüyerek yavaş bir yürüyüş, istirahat halindeyken titreme, aşırı tükürük salgılanması ve/veya salya akması, yüzde ifade kaybı
- Huzursuzluk
- Uykulu veya daha az uyanık hissetme

Yaygın

- Göğüs enfeksiyonları (bronşit), soğuk algınlığı belirtileri, sinüs enfeksiyonları, idrar yolları enfeksiyonu, gripmiş hissi
- Kilo alma, kilo verme, iştah artışı, iştah azalması
- Taşkın (çoşkun) ruh hali (mani), sinirlilik, depresyon, endişe hali
- Diskinezi: İstemsiz kas kasılması ve tekrarlayan, spastik ya da kıvrılma hareketleri ya da seğirme
- Baş dönmesi (sersemlik)
- Titreme (Sarsılma)
- Distoni: yavaş veya sürekli istemsiz kas kasılması. Bu durum vücudun herhangi bir bölümünü (ve anormal duruşla sonuçlanabilir) etkileyebildiği gibi anormal göz, ağız, dil, çene hareketlerini içeren yüz kaslarını da etkiler.
- Görmede bulanıklık
- Kalpte anormal elektriksel iletkenlik, QT aralığının uzaması (EKG isimli tetkik ile saptanan ve kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum), yavaş kalp atımı, hızlı kalp atımı
- Ayakta kalmaya bağlı düşük kan basıncı (bu nedenle PALĠGİS alan bazı insanlar bitkin, başı dönmüş hissedebilir veya aniden ayağa kalkıp oturduklarında bayılabilirler), yüksek kan basıncı
- Boğaz ağrısı, öksürük, tıkalı burun
- Bulantı, kusma, karın ağrısı ve karında rahatsızlık, ishal, kabızlık, diş ağrısı, ağız kuruluğu, hazımsızlık
- Kanda karaciğer transaminazlarda (kan tetkiki ile belirlenen ve karaciğerin

çalışmasında bir bozukluk olabileceğine işaret eden enzim düzeyleri) artış

- Döküntü, kaşıntı
- Sırt ağrısı, kemik ve kaslarda ağrı, eklem ağrısı
- Adet görememe
- Ateş, halsizlik, yorgunluk

Yaygın olmayan

- Akciğer enfeksiyonu (pnömoni), nefes yollarında enfeksiyon, idrar kesesi enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu (tonsilit), deri altında apse
- Beyaz kan hücrelerinde azalma, plateletlerde (kanamayı durdurmaya yarayan kan hücresi) azalma, kansızlık (anemi), kırmızı kan hücrelerinde azalma
- PALİGİS kan testinizde prolaktin hormon (süt yapımını sağlayan bir hormon) seviyelerinizi yükseltebilir (bu durum belirtilere neden olabilir veya olmayabilir). Yüksek prolaktin belirtileri meydana geldiğinde, bunlar erkeklerde meme şişmesi, ereksiyon (sertleşme) olmasında ya da sürdürmede zorluk ya da diğer seksüel bozukluklar; kadınlarda ise meme rahatsızlığı, memelerden süt sızması, adet periyodunun gecikmesi ya da adet düzeniyle ilgili diğer problemler
- Şeker hastalığı ya da şeker hastalığının kötüleşmesi, kan şekeri yükselmesi
- Kötü beslenme ya da düşük vücut ağırlığı ile sonuçlanan iştah kaybı
- Kanda trigliserit yükselmesi (bir çeşit yağ)
- Uyku bozuklukları, sersemlik (konfüzyon), cinsel istekte azalma, orgazm olamama, sinirlilik, kabuslar, cinsel istekte (orgazm) yetersizlik
- Tardif diskinezi (yüzde, dilde ya da diğer vücut bölümlerinde kontrol edilemeyen seğirme veya sarsılma hareketleri). Eğer istemsiz ritmik dil, ağız ve yüz hareketleriniz varsa hemen doktorunuza danışınız. PALİGİS tedavisinin sonlandırılması gerekebilir.
- Bayılma, kasılma (nöbet), konuşma ile ilgili problemler, sürekli olarak vücudun belirli yerlerini oynatma isteği, ayağa kalkınca baş dönmesi, dikkat bozukluğu, tat alma duyusunda kayıp ya da anormallik, derinin ağrı ve dokunma hissini azalması, karıncalanma, iğnelenme ya da uyuşukluk hissi
- Göz enfeksiyonu ya da “pembe göz”, gözde kuruluk
- Baş dönmesi hissetme (vertigo), kulaklarda çınlama, kulak ağrısı
- Kalbin üst ve alt kısımları arasında ileti kesilmesi, düzensiz kalp atışı, kalbin anormal elektriksel iletimi (EKG veya elektokardiyogram denilen tetkikle saptanan), göğüste

çarpıntı veya güçlü vurma hissi (palpitasyon)

- Düşük kan basıncı
- Nefes darlığı, hırıltı, burun kanamaları
- Şişmiş dil, mide ya da bağırsak enfeksiyonu, yutma güçlüğü, gaz çıkışı
- Kanda GGT (gama glutamil transferaz denilen kan tetkiki ile belirlenen ve karaciğerin çalışmasında bir bozukluk olabileceğine işaret eden enzim düzeyleri) enziminde artış, kanda karaciğer enzimlerinde artış
- Döküntü (ürtiker), saç kaybı, egzama, akne
- Kas yıkımı, kas spazmları ile salıverilen bir kas enzimi olan CPK (kreatin fosfokinaz)'nın kanda artışı, eklem sertliği, eklem şişmesi, kas zayıflığı, boyun ağrısı
- İdrar tutamama (kontrol eksikliği), sık idrar çıkışı, idrar yaparken ağrı, idrar yapamama
- Ereksiyon problemleri, ejakülasyon (boşalma) bozukluğu, cinsel işlevlerde bozukluk, memelerden süt gelmesi, düzensiz adetler ve adet ile ilgili diğer problemler (kadınlar), meme ağrısı, memede rahatsızlık,
- Yüz, ağız, göz veya dudaklarda şişme, vücutta, kollarda ya da bacaklarda şişme
- Titreme, vücut sıcaklığının artması
- Yürümede değişiklik
- Susama hissi
- Göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık, kötü hissetme
- Düşme

Seyrek

- Göz enfeksiyonu, tırnaklarda mantar enfeksiyonu, deri enfeksiyonu, akarlardan kaynaklanan deri iltihabı (enflamasyonu)
- Kanda enfeksiyonla mücadele etmek için gerekli belli bir tip beyaz kan hücresinin tehlikeli olarak düşük sayıda olması
- Enfeksiyonlara karşı korunmada yardımcı olan beyaz kan hücrelerinde azalma, eozinofillerde (genellikle alerji ile ilgili bir tip beyaz kan hücresi) artış
- Ateş, şişmiş ağız, yüz, dudak ya da dil, nefes darlığı, kaşıntı, deri döküntüsü ve bazen kan basıncının düşmesi ile karakterize ciddi alerjik reaksiyon, alerjik reaksiyon
- İdrarda şeker
- İdrar hacmini kontrol eden bir hormonun uygun olmayan biçimde salgılanması
- Kontrolsüz şeker hastalığının yaşamı tehdit eden ikinci bir hastalık veya bozukluklara

neden olması (komplikasyonlar)

- Tehlikeli olarak aşırı su alımı, kan şekeri düşmesi, aşırı su içme, kanda kolesterol seviyesinin artması
- Uyanıkken harekete geçememe veya cevap vermeme (katatoni)
- Uyurgezerlik
- Duygu eksikliği
- Nöroleptik malign sendrom (kafa karışıklığı, bilinç düzeyinde azalma ya da bilinç kaybı, yüksek ateş ve şiddetli kas sertliği),
- Beyindeki bölgesel kan dolaşımının ani olarak kesilmesi (inme ya da küçük inme), bilinç kaybı, denge bozukluğu, anormal koordinasyon,
- Beyin kan damarlarında problemler, kontrolsüz şeker hastalığı nedeniyle koma, uyarıya cevapsız kalma, kafa sarsılması, bilinç düzeyinin azalması
- Glokom (göz küresinin içinde basınç artışı, göz tansiyonu), göz hareketlerinde problem, gözlerini devirmek, gözlerde ışığa aşırı duyarlılık, artmış gözyaşı, gözlerde kızarıklık
- Atrial fibrilasyon (kalp kulakçıklarının kasılmak yerine titreşmesi ile kendini gösteren anormal bir kalp atışı), ayağa kalkınca hızlı kalp atımı
- Kan damarlarından akciğerlere hareket eden, göğüs ağrısı ve solunumda güçlüğe neden olan, damarlarda özellikle bacaklarda kan pıhtılaşması durumu (bacaklarda şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi belirtileri içeren) Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.
- Vücut kısımlarında oksijen azalması (azalmış kan akışı yüzünden), kızarma
- Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi), hızlı, yüzeysel solunum,
- Besin alımından kaynaklı akciğer enfeksiyonu (pnömoni), nefes yollarında tıkanıklık, ses rahatsızlığı
- Bağırsak tıkanıklığı, dışkıyı tutamama, çok sert dışkılama, bağırsaklarda tıkanıklığa neden olan kas yetersizliği
- Derinin ve gözlerin sararması (sarılık)
- Pankreas enflamasyonu (iltihabı)
- Boğazı tutan ve nefes almada zorluğa yol açan şişme ile karakterize ciddi alerjik reaksiyon
- Derinin kalınlaşması, kuru cilt, ciltte kızarıklık, derinin renksizleşmesi, kafa derisi veya ciltte pul pul kaşıntı, kepek

- Kas liflerinin tutulması ve kaslarda ağrı (rabdomiyalis), anormal duruş
- Priapizm (cerrahi tedavi gerektiren uzamış penil ereksiyonu)
- Erkeklerde memede büyüme, meme bezlerinde büyüme, memelerden akıntı, vajinal akıntı
- Adet periyodunun gecikmesi
- Göğüste büyüme
- Çok düşük vücut sıcaklığı, vücut sıcaklığında düşüş
- İlaç kesilme belirtileri (semptomları)

Bilinmiyor

- Akciğerde tıkanıklık, birikme
- Kanda artmış insülin (kan şekeri seviyesini ayarlayan bir hormon)

Belirtilen yan etkiler, paliperidona çok benzeyen risperidon olarak bilinen başka bir ilaçla kullanım sırasında da görülmüştür, bu yüzden bu etkilerin bu ilaçla da oluşması beklenebilir: Uyku ile ilişkili yeme bozukluğu, beyindeki kan damarı problemlerinin başka tipleri, çatırtı şeklinde akciğer sesleri.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. PALİGİS’in saklanması

PALİGİS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra PALİGİS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PALİGİS’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ümraniye/İstanbul

Üretim yeri:

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez/Kırklareli

Bu kullanma talimatı 10/09/2020 tarihinde onaylanmıştır.