

KULLANMA TALİMATI

LAKSOTEK suppozituar
Rektal yoldan uygulanır.

- **Etkin madde:** Her bir suppozituvarda 10 mg bisakodil
- **Yardımcı maddeler:** Witepsol W₄₅, Witepsol E₇₅

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1.LAKSOTEK nedir ve ne için kullanılır?**
- 2.LAKSOTEK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3.LAKSOTEK nasıl kullanılır?**
- 4.Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5.LAKSOTEK'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. LAKSOTEK nedir ve ne için kullanılır?

Bisakodil laksatifler adı verilen ilaçlar grubuna dahil bir ilaçtır. Laksatifler (yumuşatıcı ilaçlar) kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlardır.

LAKSOTEK kabızlığın kısa dönem tedavisinde ve ameliyat veya tıbbi incelemeler öncesinde bağırsakları boşaltmak amacıyla kullanılır.

LAKSOTEK kilo vermeye yardımcı olmaz.

2. LAKSOTEK 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAKSOTEK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Bu tıbbi ürünün içindeki etkin madde olan bisakodile veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
- Bulantı ve kusma ile şiddetli karın ağrınız varsa
- Şiddetli sıvı kaybınız varsa
- İleus adı verilen ince bağırsakları ilgilendiren ciddi bir karın hastalığınız varsa

- Apandisit gibi ciddi bir karın hastalığınız varsa
- Barsak tıkanıklığınız (intestinal obstrüksiyon) varsa
- İnce veya kalın bağırsaklarınızda iltihaplanma varsa
- Makat bölgenizde deri çatlakları (anal fissür) varsa
- Makat bölgenizde iltihaplanma veya yara (ülseratif proktit) varsa

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Bazı hastalarda LAKSOTEK kullanımı sersemlik ve baş dönmesine yol açabilir. Sizde bu gibi belirtiler olduğunda bu hisler ortadan kalkıncaya kadar araç ve makine kullanmayınız.

LAKSOTEK'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAKSOTEK içinde uyarı gerektiren bir madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıda belirtilen ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bilgilendirin

- İdrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid, bendrofluazid) kullanıyorsanız.
- Prednizolon gibi bir steroid ilaç kullanıyorsanız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LAKSOTEK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Bu ilacı her zaman kesin olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız.

LAKSOTEK suppozituar asla yutulmamalıdır.

Suppozituarı perforasyon bölgesinden öncelikle ayırarak daha sonra iki tarafından tutarak nazik bir şekilde ayırarak çıkarınız.

Kabızlığın kısa dönem tedavisinde erişkinlerde ve 10 yaşın üzerindeki çocuklarda bir suppozituar rektal yoldan (makata) uygulanır.

Ameliyat veya tıbbi incelemeler öncesi bağırsakları boşaltmak amacıyla sadece tıbbi gözetim altında kullanılabilir.

Tüm laksatiflerde olduğu gibi günlük olarak uygulanan LAKSOTEK 10 mg 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Eğer her gün bir laksatife ihtiyacınız varsa doktorunuz ile görüşünüz.

Uygulama yolu ve metodu:

LAKSOTEK rektal yoldan (makata) uygulanır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

LAKSOTEK kullanımı 10 yaşın altındaki çocuklarda uygun değildir.

Yaşlılarda kullanım:

LAKSOTEK'in yaşlılarda kullanımıyla ilgili özel bir talimat bulunmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LAKSOTEK kullandıysanız:

LAKSOTEK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LAKSOTEK'i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu atlarsanız, atladığınız dozu tamamen unutunuz ve bir sonraki dozunuza zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bu tıbbi ürünün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastada birden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastada birden az görülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, LAKSOTEK'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
- Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkması halinde
- Deride yaygın kızarıklık ve döküntüler ya da parmaklarda şişme olması durumunda

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin LAKSOTEK'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın

- Karında ağrı,
- Karında kramplar,
- Bulantı,
- İshal

Yaygın olmayan

- Baş dönmesi,
- Kusma,
- Dışkıda kan,
- Karında rahatsızlık hissi,
- Makat bölgesi veya içinde rahatsızlık hissi

Seyrek

- Aşırı duyarlılık,
- Şiddetli alerjik reaksiyonlar,
- Bayılma (Senkop),
- Aşırı sıvı kaybı (Dehidratasyon),
- Bağırsağın iltihaplı bir hastalığı (Kolit)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” i konuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LAKSOTEK'in saklanması

LAKSOTEK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2-4°C arasında buzdolabında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi ilgili ayın son gününü gösterir.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAKSOTEK'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları öpe atmayınız! evre ve řehircilik Bakanlıđınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Bilim İla San. ve Tic. A.ř.
34398 Maslak-İSTANBUL

Üretim yeri:

Bilim İla San. ve Tic. A.ř.
34398 Maslak-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıřtır.