

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Foeniculum vulgare</i> Miller subsp. <i>vulgare</i> var. <i>dulce</i> (Miller) Thellung İngilizce: Sweet fennel fruit Türkçe: Rezene Sinonimi: <i>Anethum dulce</i> DC.	Latince: <i>Foeniculum vulgare</i> Miller subsp. <i>vulgare</i> var. <i>vulgare</i> İngilizce: Bitter fennel fruit Türkçe: Rezene Sinonimi: -
FAMİLYASI	Apiaceae	
KULLANILAN KISMI	Meyve ve uçucu yağı	
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye (anetol) ve Apiaceae (Umbelliferae) familyası bitkilerine karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Cildi veya solunum sistemini etkileyen alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.</p> <p>Epilepsi hastalarında kullanılması önerilmez.</p> <p>İki haftadan fazla kullanılmamalıdır.</p> <p>Uçucu yağın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı kontrendikedir.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için meyvelerinin, çocuk doktorunun tavsiyesi olmaksızın 4 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Uçucu yağı göğüs kanseri, uterus kanseri, ovaryum kanseri, endometriyozis ve miyom benzeri hormon duyarlı hastalıklarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>	
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Uçucu yağı antikoagulanlar, antiplatelet ajanlar, düşük molekül ağırlıklı heparinler, trombolitik ajanlar, siprofloksazinle, oral kontraseptiflerle, östrojenik ilaçlarla ve diğer hormon preparatlarıyla etkileşebilir.	
LİTERATÜR	<p>1) EMA, 2007</p> <p>2) FFD, 2011</p> <p>3) WebMD</p>	

\*Tıbbi bitkilerin endikasyonlarına karşılık gelen terimdir.

\*\*EMA'nın geleneksel bitki tanımına uygun olarak hazırlanmıştır.

\*\*\*EMA'da yer almayan kullanımlarda diğer bilimsel kaynaklardan (FFD, WebMD, PDR gibi) yararlanılmıştır.