

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Achillea millefolium</i> L. İngilizce: Devil's Nettle, Yarrow Türkçe: Civanperçemi, Barsam otu Sinonimi (varsa): <i>Achillea borealis</i> Bong., <i>A. lanulosa</i> Nutt.
FAMİLYASI	Asteraceae (Compositae)
KULLANILAN KISMI	Toprak üstü kısımları
GÜVENLİKLE İLGİLİ UYARILAR	Aktif maddeye ve Asteraceae familyası bitkilerine karşı aşırı duyarlılık görülebilir. Cerrahi operasyondan iki hafta önce kullanımı kesilmelidir. Dahilen iki hafta, haricen bir hafta kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Yeterli veri olmaması nedeniyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Antiplatelet ve antikoagülanlar, lityum, barbitüratlar, antiasitler, H2 blokerleri, proton pompası inhibitörleri ile etkileşir.
LİTERATÜR	1) EMA, 2011 2) FFD, 2011 3) PDR, 2000 4) WebMD