

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Aesculus hippocastanum</i> L. İngilizce: Horse- Chesnut Türkçe: Atkestanesi Sinonimi (varsa): <i>Aesculus castanea</i> Gilib., <i>Castanea equina</i> L., <i>Hippocastanum vulgare</i> Guerin.
FAMİLYASI	Hippocastanaceae
KULLANILAN KISMI	Tohumları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Tohumlar çiğ olarak ağızdan alındığında etkin maddeye bağlı olarak ölümlü sonuçlanabilen zehirlenmeler görülebilir. Zehirlenme belirtileri gastrointestinal şikayetler, baş ağrısı, vertigo, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlar şeklinde oluşabilir.</p> <p>Kronik böbrek ve safra kesesi rahatsızlıklarında dikkatli kullanılmalıdır.</p> <p>A, D, E ve K vitaminlerinin absorpsiyonunu azaltır.</p> <p>Cerrahi ameliyatlardan en az 2 hafta önce at kestanesi ürünlerinin kullanılması kesilmelidir.</p> <p>Açık yaralarda emboli ve tromboz riski nedeniyle kullanımı önerilmemektedir.</p> <p>Hipoglisemisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.</p> <p>Mide barsak sisteminde düzensizliği olanlar kullanmamalıdır.</p> <p>Karaciğer ile ilgili problemi olanlara önerilmemelidir.</p> <p>Latekse alerjisi olanlarda alerjik reaksiyonlar yapabilir.</p> <p>Böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda böbrek yetmezliğine neden olabilir.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığından 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığından hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Lityum, antidiyabetik ilaçların tümü, antikoagülanlar, fenopirazon ve digoksin ile birlikte kullanılmamalıdır.
LİTERATÜR	1) EMA, 2008 2) FFD, 2017 3) PDR, 2000