

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Aloe ferox</i> Miller İngilizce: Aloe, Cape Aloe Türkçe: Sarısabır, Öd ağacı, Kap alole Sinonimi (varsa): <i>Aloe lucida</i> , <i>A. supralaevis</i> Haw., <i>A. horrida</i> Haw., <i>A. perfoliata</i> Thunberg., <i>A. pseudoferox</i> Salm. Dyck., <i>A. socotriana</i> Masson., <i>Pachydendron ferox</i> Humb. & Bonpl., <i>P. Supralaeve</i> Haw.
FAMİLYASI	Asphodelaceae (Liliaceae)
KULLANILAN KISMI	Yapraklardan çıkarılan lateks (Sarımsı Süt)
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Yüksek miktarda ve uzun süre kullanılması halinde kolon kanseri riskini artırabilir, bağırsak delinmelerine, kanlı ishale, böbrek iltihabına, nefes darlığına ve çarpıntıya neden olabilir.</p> <p>Gastrointestinal sistemde kramp, elektrolit ve potasyum kaybı, idrarda albumin ve eritrosit görülebilir.</p> <p>Crohn's hastalığı, ülseratif kolitte kullanılmamalıdır.</p> <p>Hemoroidal durumlarda ve böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda önerilmez.</p> <p>Cerrahi ameliyattan 2 hafta önce kullanımı bırakılmalıdır.</p> <p>İdrarda renklenme görülebilir. Ancak bu durum zararsızdır.</p> <p>İki haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, 12 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Kan sulandırıcılar, cerrahide kullanılan bazı anestezi ilaçları (sevofluran, ultan), kalp glikozitleri, antiaritmikler, antidiyabetik ilaçlar, tiyazit grubu diüretikler ve kortikosteroidlerle kullanılmamalıdır. Meyan kökü, sodyum pikosülfat, Cascara sagrada, kastor yağı, sennozidler gibi stimulan laksatiflerle beraber su ve elektrolit kaybına yol açacağı için önerilmez.
LİTERATÜR	1) EMA, 2016 2) FFD, 2017 3) PDR, 2000