

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>minimum</i> (Miller) Heiser İngilizce: Bell, sweet or chili pepper, cayenne, Jalapeno Türkçe: Kırmızı Biber Sinonimi (varsa): <i>Capsicum annuum</i> var. <i>annuum</i> L.
FAMİLYASI	Solanaceae
KULLANILAN KISMI	Kurutulmuş olgun meyveler
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Eldiven lateksine alerjisi olanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişmesi nedeniyle kullanımı önerilmez.</p> <p>Ülserde, mide inflamasyonunda ve kronik barsak inflamasyonu olanlarda kullanımından kaçınılmalıdır.</p> <p>Bitki tozu ve ekstresi solunmamalıdır.</p> <p>Açık yaralarda, egzemada kullanılmamalı ve göze uygulanmamalıdır.</p> <p>Toksik dozda hipotermi, uzun süre yüksek dozda kronik gastrit, böbrek ve karaciğer bozuklukları ile nörotoksik etkiler görülebilir.</p> <p>Tedavi esnasında güneş, sıcak su ve diğer ısı kaynaklarının (termofor vb.) uygulanmasından kaçınılmalıdır.</p> <p>Kullanım esnasında belirtiler kötüleşirse bir hekim veya eczacıyla görüşülmelidir.</p> <p>2 günden daha uzun süreli uygulamalarından kaçınılmalı ve aradan 14 gün geçmeden yeni bir uygulama yapılmamalıdır.</p> <p>Ağrı devam ettiği sürece hekim kontrolünde 3 haftaya kadar tedaviye devam edilebilir ancak 3 haftalık kullanımdan sonra en az 2 haftalık bir ara verilmelidir.</p> <p>Diğer benzer amaçlı topikal ürünler ile aynı zamanda uygulanmaya yönelik değildir.</p> <p>Kullanım sırasında belirtiler devam ederse hekim veya eczacıya danışılmalıdır.</p> <p>Yeterli veri olmaması sebebiyle hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	ACE inhibitörleri, antikoagulanlar, barbitüratlar, teofilin ve salisilik asit türevleri ile etkileşir.
LİTERATÜR	1) PDR, 2007 2) FFD, 2017 3) EMA, 2015