

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt. İngilizce: Black Cohosh Türkçe: - Sinonimi (varsa): <i>Actaea racemosa</i> L.
FAMİLYASI	Ranunculaceae
KULLANILAN KISMI	Kök ve rizomları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	Aktif bileşenlere karşı aşırı duyarlılık gelişebilir Nadiren mide bozukluğu, baş ağrısı, vertigo, kilo alımı, bacaklarda ağırlık hissi ve östrojen stimüle edici etkisine bağlı olarak vajinal kanama, endometriyal hiperplazi görülebilir. Meme kanseri olan kişilerin hekim kontrolünde kullanması önerilmektedir. Sık olmamakla birlikte karaciğer toksisitesi, alerjik deri reaksiyonları, yüz, kol ve bacaklarda şişme, gastrointestinal şikayetler görülebilir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Östrojen preparatları, doğum kontrol ilaçları, azotiyopirin, siklosporin, antihipertansifler, amiodaron gibi antiaritmikler, antikoagülanlar, karbamazepin, tamoksifen ve demir içeren ürünlerle etkileşir.
LİTERATÜR	1) PDR, 2000 2) FFD, 2011 3) EMA, 2018