

▼ Dabigatran eteksilat

- Bu kartı her zaman yanınızda bulundurun
- En son versiyonu kullandığınızdan emin olun

Sayın hasta,

Doktorunuz Dabigatran Eteksilat ile tedaviye başlamıştır. Dabigatran Eteksilat'ı güvenle kullanmak için lütfen içindeki önemli bilgileri dikkate alınız.

Bu hasta uyarı kartı tedavinizle ilgili önemli bilgiler içerdiğinden, sağlık uzmanlarını Dabigatran Eteksilat alımınız hakkında bilgilendirmek için lütfen bu kartı her zaman yanınızda taşıyınız.

1

Dabigatran Eteksilat için Hastalara Yönelik Bilgiler

Tedaviniz hakkında

- Dabigatran Eteksilat'ın kan inceltme özelliği vardır, bu da tehlikeli kan pıhtılarının oluşmasını engeller.
- Dabigatran Eteksilat kullanırken doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuzla konuşmadan asla bir dozu atlamayınız veya Dabigatran Eteksilat alımını kesmeyiniz.
- Kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz.
- Herhangi bir cerrahi/invaziv prosedürden önce Dabigatran Eteksilat alımınız hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz.

2

- Dabigatran Eteksilat aç veya tok karına alınabilir. Kapsülü bir bardak su ile bütün olarak yutunuz. Kapsülü kırmayınız, çiğnemeyiniz veya kapsül içeriğini başka yere boşaltarak kullanmayınız.

Ne zaman tıbbi yardım alınmalı?

- Dabigatran Eteksilat kullanımı kanama riskini artırabilir. Aşağıdaki olası kanama belirti ve semptomlarından herhangi birini yaşıyorsanız hemen doktorunuzla konuşunuz: şişme, rahatsızlık, olağandışı ağrı veya baş ağrısı, baş dönmesi, solgunluk, halsizlik, olağandışı morarma, burun kanaması, diş eti kanaması, olağandışı uzun kanamalı kesikler, anormal adet kanaması, akıntı veya vajinal

3

kanama, idrarınızda pembe veya kahverengi renkte olabilen kan, kırmızı/siyah dışkı, kan tükürme, kan veya kahve telvesi benzeri maddeler kusma.

- Düşerseniz veya kendi kendinizi yaralarsanız, özellikle başınızı çarparsanız, acilen tıbbi yardım alın.
- Mide ekşimesi, mide bulantısı, kusma, mide rahatsızlığı, şişkinlik veya üst karın ağrısı yaşarsanız, doktorunuzla konuşmadan Dabigatran Eteksilat alımını kesmeyiniz.

4

Dabigatran Eteksilat için Sağlık Mesleği Mensuplarına Yönelik Bilgiler

- Dabigatran Eteksilat bir oral antikoagülandır (doğrudan trombin inhibitörü).
- Dabigatran Eteksilat tedavisinin cerrahi veya diğer invaziv prosedürlerden önce durdurulması gerekebilir.
- Majör kanama olaylarında Dabigatran Eteksilat tedavisi derhal durdurulmalıdır.
- Spesifik bir tersine çevirici ajan Idaricuzumab mevcuttur (lütfen Dabigatran Eteksilat ve Idaricuzumab Kısa Ürün Bilgisine bakınız).
- Dabigatran Eteksilat esas olarak böbrekler tarafından atılır; yeterli diürez sağlanmalıdır. Dabigatran Eteksilat diyalize edilebilir.

5

Lütfen bu bölümü doldurunuz veya doktorunuzdan doldurmasını rica ediniz.

Hasta Bilgileri

6

Hastanın Adı-Soyadı

Doğum Tarihi

Antikoagülasyon Endikasyonu

Dabigatran Eteksilat Dozu

7

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız