

|  |   |
|--|---|
| BİTKİNİN ADI                             | Latince: <i>Ilex paraguariensis</i> St.-Hil.<br>İngilizce: Mate, Yerba Mate, Paraguay Tea<br>Türkçe: Paraguay çayı, Mate<br>Sinonimi (varsa): <i>Ilex paraguayensis</i> St.-Hil.  |
| FAMİLYASI                                | Aquifoliaceae   |
| KULLANILAN KISMI                         | Yaprakları  |
| GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR             | <p>Aktif bileşenlere karşı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Mide-barsak ülserinde, hipertansiyon ve aritmi gibi kalp rahatsızlıklarında, tiroid bezinin aşırı çalışması durumunda kullanılmamalıdır.</p> <p>Fazla tüketildiğinde uykusuzluk, sıkıntı, gerginlik ve kalp çarpıntısı gibi problemler görülmektedir.</p> <p>Ateş, idrar yanması, kasılmalar ya da idrarda kan görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Yeterli veri olmaması sebebiyle hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Bir haftalık kullanım süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p> |
| İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER | MAO inhibitörleri, sempatomimetik ilaçlarla, amfetaminler, kokain, efedrin, sedatif etkili ilaçlar, kinolon antibiyotikleri, simetidin, klozapin, dipiridamol, disülfüran, östrojenler, fluvoksamin, lityum, antikoagülan, antiplateletler, nikotin, pentobarbital, fenilpropanolamin, riluzol, teofilin ve verapamil ile etkileşir.  |
| LİTERATÜR                                | 1) PDR, 2000<br>2) FFD, 2017<br>3) EMA, 2011<br>4) WebMD  |