

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. veya <i>Paeonia veitchii</i> Lynch İngilizce: Peony red root Türkçe: Şakayık Sinonimi (varsa): -
FAMİLYASI	Paeoniaceae
KULLANILAN KISMI	Kökleri
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye ve Paeoniaceae familyası bitkilerine karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Kontakt dermatite neden olabilir (4).</p> <p><i>Paeonia</i> cinsine ait türler çeşitli kaynaklarda farklı isimlerde veya sinonim olarak geçebilir. Tıbbi ürün değerlendirilirken riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.</p> <p>Meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve endometriozisde kullanılmamalıdır (5).</p> <p>Cerrahi operasyonlardan en az 2 hafta önce kullanımının bırakılması gereklidir (5).</p> <p><i>P. lactiflora</i> kullanılırken <i>Fritillaria verticillata</i>, <i>Cuscuta japonica</i> ve <i>Rheum officinale</i> ile kesinlikle kombine edilmemelidir (3).</p> <p>Total glikozitleri (TGP) içeren fraksiyonu belirtilen dozlarda 6 aydan fazla kullanılmamalıdır (5).</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emzirenlerde kullanılması önerilmez.</p> <p>Eczacı ve bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim danışmanlığında kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	<p>Antiepileptik ilaçlarla etkileşime girme eğilimi yüksektir. Antibiyotikler ile birlikte verilmesi de önerilmemektedir. Antibiyotikler, şakayığın etkinliğini azaltabilir (4).</p> <p>Fenitoin, kontraseptifler, CYP1A2, CYP3A4, östrojenler, antikoagülan/antiplatelet ilaçlar ile etkileşebilir (5).</p>
LİTERATÜR (Bilimsel yazım kurallarına göre güncellenecek)	<ol style="list-style-type: none"> 1) THMP 2011, UK 2) Komisyon E (1988) 3) WHO Monografları (1999) 4) EMA Assessment report on <i>Paeonia spec.</i>, 2017. 5) WebMD