

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. İngilizce: Milk thistle Türkçe: Meryemana diken, Devedikeni, Gengel Sinonimi (varsa): <i>Carduus marianus</i> L., <i>Silybum pygmaeum</i> Cass., <i>Carthamus maculatus</i> (Scop.) Lam., <i>Mariana lactea</i> Hill
FAMİLYASI	Asteraceae
KULLANILAN KISMI	Meyveleri
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Kullanımı sırasında belirtilerin kötüleşmesi veya iki haftadan daha fazla sürmesi, idrar veya dışkı renginde bir değişiklik olması veya sarılık görülmesi halinde hekime danışılmalıdır.</p> <p>Ağız kuruluğu, bulantı, mide rahatsızlığı, gastrik irritasyon, diyare gibi hafif gastrointestinal şikâyetler; dermatit, ürtiker, deri döküntüsü, kaşıntı, anafilaksi, astım gibi alerjik reaksiyonlar ve baş ağrısı görülebilir.</p> <p>Yeterli veri olmaması sebebiyle 18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri olmaması nedeniyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Karaciğerde CYP2C9 tarafından metabolize edilen ve glukuronidasyona uğrayan ilaçlar (amitriptilin, diazepam, zileuton, celecoxib, diklofenak, fluvastatin, glipizit, ibuprofen, irbesartan, losartan, fenitoin, piroksikam, tamoksifen, tolbutamid, torsemit, warfarin, asetaminofen, atorvastatin, digoksin, entakapon, östrojen, irinotekan, lamotrigin, lorazepam, lovastatin, meprobamat, morfin, oksazepam vb.) ile etkileşir.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none">1) EMA, 2018.2) FFD, 2017.3) PDR, 2000.4) Komisyon E, 1998.5) Baytop, T., Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Günümüzde), 19996) WebMD