

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz Bip. İngilizce: Feverfew Türkçe: Gümüş düğme Sinonimi : <i>Chrysanthemum parthenium</i> (L.) Bernh., <i>Leucanthemum parthenium</i> (L.) Gren.&Gordon, <i>Matricaria parthenium</i> L., <i>Pyrethrum parthenium</i> (L.) Sm.
FAMİLYASI	Asteraceae
KULLANILAN KISMI	Toprak üstü kısımları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir. Kullanımı sırasında ağız ülserleri ve gastrointestinal şikâyetler oluşabilir. İki ay kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Yeterli veri mevcut olmadığı için, 18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Yeterli veri olmaması nedeniyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER	CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4 ile metabolize olan ilaçlar, aspirin ve varfarin gibi antikoagülanlar ve antiplatelet ilaçlar ile etkileşir.
LİTERATÜR	1) FFD, 2011 2) ESCOP, 2003 3) PDR, 2000 4) EMA, 2011