

## KULLANMA TALİMATI

### DİVATOR 20 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her tablet 20 mg atorvastatine eşdeğer 21,68 mg atorvastatin kalsiyum içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Kalsiyum karbonat, laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilmiştir.), mikrokristal selüloz, kroscarmeloz sodyum, hidroksi propil selüloz, polisorbata 80, magnezyum stearate, saf su, film kaplama (polivinil alkol, titanyum dioksit, PEG 3350 toz, talk).

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. DİVATOR nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. DİVATOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. DİVATOR nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. DİVATOR'un saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. DİVATOR nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film kaplı tablet, 20 mg atorvastatine eşdeğer 21,68 mg atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

DİVATOR beyaz film kaplı tabletlerdir.

DİVATOR statinler olarak da bilinen lipid düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir. Kolesterolün ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

DİVATOR, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, DİVATOR bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

## 2. DİVATOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

**DİVATOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.**

Eğer;

- Atorvastatine ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
- Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
- Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
- Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyse,
- Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,
- Aşırı miktarda alkol aldıysanız.
- Hepatit C tedavisinde glecaprevir/pibrentasvir kombinasyonunu kullanırsanız.

**DİVATOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- B brek problemleriniz ya da b brek problemi  yk n z varsa,
- Eęer daha  nce tekrarlayan ya da a ıklanamayan kas aęrılarınız ve sızılarınız olmuŗa, kendinizde ya da ailenizde kas sorunu  yk s  varsa,
- Eęer daha  nce beyin i ine kanama ile seyreden inme ge irmiŗseniz ya da  nceki inmelerinize baęlı olarak beyninizde sıvı dolu kistler oluŗmuŗa,
- Daha  nce dięer lipid d ŗ r c  ila lar (orneęin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas aęrısı, g c s z l ę  vb.),
- S rekli ve y ksek miktarda alkol alıyorsanız,
- Bazı Őekerlere karŗı intoleransınız var ise,
-  nemli bir solunum g c l ę n z var ise,
- Hipotiroidizm (v cutta tiroid hormonunun gereęinden az  retilmesi) varsa,
- 70 yaŗından daha yaŗlı iseniz,
- Őeker hastalıęı a ısından risk fakt rleriniz var ise. Őeker hastalıęınız varsa veya Őeker hastalıęı geliŗtirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda y ksek Őeker ve yaę seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve y ksek kan basıncınız varsa; Őeker hastalıęı geliŗtirme riskiniz olabilir.
- Aęızdan veya enjeksiyon yoluyla Fusidik asit isimli bir ila  (bakteriyel enfeksiyonların tedavisi i in kullanılan bir ila ) kullanıyorsanız veya son 7 g n i inde kullandıysanız. Fusidik asit ve D VATOR'un beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomyoliz) yol a abilir.

Eęer bunlardan herhangi biri sizin i in ge erli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler a ısından risklerinizi  ng rebilmek i in doktorunuz D VATOR tedavisi  ncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiya  duyacaktır. Bazı ila lar aynı zamanda alındıęında  rneęin bir t r kas hastalıęı olan rabdomyoliz gibi kasla ilgili yan etkilerin riskinin arttıęı bilinmektedir.

Ayrıca, eęer devamlı kas zayıflıęınız mevcutsa doktorunuz ya da eczacınıza s yleyiniz. Tanı ve tedaviniz i in ek testler ve ila lar gerekli olabilir.

Eęer daha  nce inme ge irdiyseniz doktorunuza s yleyiniz; doktorunuz sizin i in en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, ge miŗteki herhangi bir d nemde dahi olsa sizin i in ge erliyse l tfen doktorunuza danıŗınız.

## **DİVATOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

DİVATOR kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek DİVATOR'un etkilerini değiştirebilir.

Bu ilacı alırken çok fazla alkol almaktan kaçınınız.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız DİVATOR kullanmayınız. Hamile kalma olasılığınız varsa güvenilir doğum kontrol önlemleri kullanmadığınız sürece DİVATOR almayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emziriyorsanız DİVATOR kullanmayınız.

Hamilelik ve emzirme döneminde DİVATOR'un güvenliliği henüz kanıtlanmamıştır.

## **Araç ve makine kullanımı**

DİVATOR kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Araç ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

## **DİVATOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

DİVATOR laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer başka bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda almışsanız veya almış olma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyin. Bazı ilaçlar DİVATOR'un etkililiğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkililiğini DİVATOR tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim

ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca Bölüm 4’de açıklanan rabdomiyoliz diye bilinen, önemli kas zayıflatıcı durum da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir.

DİVATOR ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

- Bağıışıklık sisteminin çalışmasını deęiřtiren ilaçlar; örneęin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karřı etkili ilaçlar
- Belli enfeksiyon hastalıklarına karřı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karřı etkili ilaçlar; örneęin eritromisin, klaritromisin, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, fukanazol, posakonazol, rifampin, fusidik asit
- Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneęin gemfibrozil, dięer fibratlar ~~fenofibrat~~, kolestipol
- Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması/ tıkanması ile ortaya çıkan göęüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneęin amlodipin, diltiazem
- Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneęin digoksin, verapamil, amiodaron
- Letermovir (sitomegalovirüs hastalığına yakalanmanıza engel olan bir ilaç)
- AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir kombinasyonu gibi ilaçlar
- Hepatit C tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, örneęin telaprevir, boceprevir ve elbasvir/grazoprevir kombinasyonu
- DİVATOR ile etkileşime girdięi bilenen dięer ilaçlar;
  - ezetimib (kolesterol düşürücü)
  - varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır)
  - doğum kontrol hapları
  - stiripentol (sara nöbeti engelleyici)
  - simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır)
  - fenazon (aęrı kesici)
  - kolşisin (gut tedavisinde kullanılır)
  - antiasitler (alüminyum ya da magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları)
  - sarı kantaron (St.John’s Wort)
- Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız DİVATOR kullanmayı geçici olarak durdurun. Doktorunuz size ne zaman yeniden DİVATOR kullanmaya başlayabileceęinizi söyleyecektir. DİVATOR ile fusidik asitin

birlikte kullanılması nadiren kas zayıflığı, hassasiyeti ya da ağrısına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Rabdomiyoliz ile daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 4.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DİVATOR nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

- DİVATOR'un yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10mg'dır.
- Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir. DİVATOR'un en yüksek dozu günde bir kez 80 mg'dır.
- DİVATOR tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyet girilmelidir ve bu diyet DİVATOR tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.
- DİVATOR'u doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla kontrol ediniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- DİVATOR tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.
- Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.
- Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 80 mg'dır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında DİVATOR'un güvenliği, etkililiği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiç bir farklılık gözlenmemiştir.

#### **Özel kullanım durumları**

##### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

**Karaciğer yetmezliđi:**

DİVATOR aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. DİVATOR ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

*Eđer DİVATOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla DİVATOR kullandıysanız:**

*DİVATOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**DİVATOR'u kullanmayı unutursanız:**

Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki zamanlanmış dozunuzu doğru zamanda alınız. *Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**DİVATOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınızla görüşünüz.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DİVATOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, DİVATOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.
- Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.
- Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü
- Kas zayıflığı, gerginliği, ağrısı veya yırtılması veya idrarda kırmızı-kahverengi renk değişimi olabilirken, özellikle de aynı zamanda kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz çıktıysa bu anormal kas yıkımı nedeniyle (rabdomiyaliz) olmuş olabilir. Bu

anormal kas yıkımı atorvastatin almayı bırakmış olsanız bile her zaman kendiliğinden düzelmez. Hayatı tehdit edebilir ve böbrek problemlerine yol açabilir.

Doktorunuz DİVATOR kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemlerinizi devam ediyorsa derhal doktorunuza bildirin. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.

**Çok seyrek durumlar** DİVATOR kullanan 10.000 hastada 1'den azını etkiler (bu da DİVATOR kullanan 10.000 hastadan 9.999'unda bu yan etkilerin görülmesinin beklenmemesi anlamına gelir).

- Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz DİVATOR almaya başlamadan önce veya DİVATOR alırken karaciğer problemi belirtileriniz varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildirin:

- o Yorgunluk ya da zayıflık hissi
- o İştah kaybı
- o Üst karın ağrısı
- o Koyu amber renkli idrar
- o Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması

- Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), eritema multiforme (lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yaralanmaları, karaciğer yetmezliği, tat almada değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.

- Lupus benzeri sendrom (döküntü, eklem hastalıkları ve kan hücreleri üzerindeki etkileri dahil).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.



Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

### **Diğer olası yan etkiler:**

#### **Yaygın**

- Burun yollarında iltihap, boğaz ağrısı, burun kanaması
- Alerjik reaksiyonlar
- Kan şekeri seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şekeri seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış
- Baş ağrısı
- Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal
- Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı
- Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları

#### **Yaygın olmayan**

- İştah kaybı (anoreksiya), kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şekeri seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)
- Kabus görme, uykusuzluk
- Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı
- Bulanık görme
- Kulaklarda ve/veya kafada çınlama
- Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı)
- Hepatit (karaciğer iltihabı)
- Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi
- Boyun ağrısı, kas yorgunluğu
- Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklık
- İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi

## **Seyrek**

- Görme bozukluğu
- Beklenmeyen kanama veya morarma
- Sarılık (deri ve göz aklarının sararması)
- Tendon (kas kirişi) zedelenmesi

## **Çok seyrek**

- Bir alerjik reaksiyon – belirtiler; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps (ani dolaşım yetmezliği)
- İşitme kaybı
- Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)

## **Bilinmiyor**

- Devamlı kas zayıflığı

Statinlerle (DİVATOR ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:

- Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon)
- Cinsel zorluklar
- Depresyon
- Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,
- Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta

olduđunuz ilacın gvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

## **5. DİVATOR'un saklanması**

*DİVATOR'u ocukların gremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİVATOR'u kullanmayınız.*

Eđer rnde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİVATOR'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları pe atmayınız! evre ve Őehircilik Bakanlıđı'nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

### ***Ruhsat Sahibi:***

Drogsan İlaları San. ve Tic. A.Ő.  
Ođuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 06520  
Balgat-ANKARA

### ***retim Yeri:***

Drogsan İlaları San. ve Tic. A.Ő.  
06760 ubuk – ANKARA

*Bu kullanma talimatı ----- tarihinde onaylanmıřtır.*