| TBM003a1, TBM004a1 | | |
|---|---|---|
| BİTKİNİN ADI | Latince: *Malva sylvestris* L.<br>İngilizce: Mallow, High mallow, Blue mallow, Common mallow<br>Türkçe: Büyük Ebegümeci<br>Sinonimi: *M. ambigua* Guss., M. *mauritiana* L. | Latince: *Malva neglecta* Wallr.<br>İngilizce: Mallow, Dwarf mallow<br>Türkçe: Küçük Ebegümeci,<br>Sinonimi: *M. fruticans* Dorn. ex Rchb., *M. orbiculata* Pomel, *M. salvitellensis* Briganti |
| FAMİLYASI | Malvaceae | |
| KULLANILAN KISMI | Çiçekler, yapraklar | Yapraklar |
| GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR | Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık oluşabilir (1, 2).<br><br>Ağız veya boğaz tahrişine bağlı kuru öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanımında belirtiler 1 haftadan uzun sürerse bir hekime veya eczacıya danışılmalıdır (1, 2).<br><br>Hafif gastrointestinal rahatsızlıkların semptomatik tedavisinde kullanımında belirtiler 2 haftadan uzun sürerse bir hekime veya eczacıya danışılmalıdır (1, 2).<br><br>Oral olarak belirtilen süreden uzun kullanıldığında bazı kişilerde mide bulantısı, ishal ve hazımsızlık gibi mide sorunlarına neden olabilir (3).<br><br>Kullanımı sırasında solunum güçlüğü, ateş veya cerahatli balgam görülürse bir hekime veya eczacıya danışılmalıdır (1, 2).<br><br>Kullanım sırasında semptomlar kötüye gider veya herhangi bir advers reaksiyon görülürse bir hekime veya eczacıya danışılmalıdır (1, 2).<br><br>Yeterli veri olmadığı için, 12 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez (1, 2, 3).<br><br>Yeterli veri olmadığı için, hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılması önerilmez (1, 2, 3).<br><br>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır. | |
| İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER | - | |
| LİTERATÜR | 1) EMA, 2018-*M. sylvestris* çiçekleri<br>2) EMA 2018- *M. sylvestris* ve *M. neglecta* yaprakları<br>3) WebMD, https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-192/mallow Erişim tarihi 18.01.2023. | |