

## KULLANMA TALİMATI

### FURACİN soluble dressing merhem

#### Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Her bir tüpte % 0.2 furacin (nitrofurazon) bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Polietilen glikol 300, polietilen glikol 1000, polietilen glikol 4000

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **FURACİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FURACİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FURACİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FURACİN'in saklanması**

#### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. FURACİN nedir ve ne için kullanılır?**

FURACİN cilt üzerine uygulanan ve karakteristik kokulu, limon sarısı renkte, opak, yarı şeffaf bir merhemdir.

FURACİN 56 g'lık ambalajda kullanıma sunulmaktadır.

FURACİN, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların (mikropların) oluşturduğu piyoderma (ciltte sivilceli durum), dermatoz (deride oluşan hastalık) gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik, yara, yanık ve ülser (derideki bir tür yara) enfeksiyonların ve otitis eksterna (dış kulak iltihabı) tedavisinde kullanılır.

#### **2. FURACİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **FURACİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

Nitrofurazona karşı veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

## **FURACİN'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer;

- Yiyecekler, boyalar, koruyucular veya herhangi bir ilaca karřı bir alerjiniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.
- Böbrek yetmezliđi durumlarında bu ilacı dikkatli kullanınız. FURACİN'in bileřiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmıř vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluđunuzu artırabilir.
- Cildinizdeki yanık ya da yara düzelmezse veya daha kötüleřirse doktorunuza bařvurunuz.
- Cildinizde yerel hassasiyet ve tahriř belirtileri oluřtuysa ilacın kullanımına son veriniz ve doktorunuza bildiriniz.
- Cilt üzerine kullanılan antibakteriyel ilaçlar ile, seyrek olarak ilaca duyarlı olmayan mantarların da içinde olduđu gibi bir grup mikroorganizma (mikrop) tarafından enfeksiyon oluřabilir. Eđer böyle bir durum oluřursa derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **FURACİN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

FURACİN haricen cilde uygulanan bir merhem olduđundan yiyecek ve ieceklerle etkileřmez.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

FURACİN'in hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut deđildir. Ancak yarar/zarar iliřkisi hekimce etraflı olarak deđerlendirilmek kořulu ile kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emziriyorsanız FURACİN kullanmayınız.

### **Ara ve makine kullanımı**

FURACİN'in ara sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası deđildir.

### **FURACİN'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bileřiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmıř vücut bölgelerinden emilerek mevcut böbrek bozukluđunuzu artırabilir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

FURACİN'in diđer ilalarla bilinen bir etkileřimi bulunmamaktadır.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. FURACİN nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

FURACİN'i doktorunuzun önerdiği süre ve miktarda uygulayınız. FURACİN, uygulama ya da pansuman şekline göre, günlük olarak veya birkaç günde bir enfeksiyonlu bölgeye iyileşme sağlanıncaya dek uygulanır. Tedaviye 7-10 gün devam edilmesi önerilir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

FURACİN cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Lezyonların üzerine doğrudan doğruya bir gazlı bez veya spatül ile uygulanır. Geniş yanık alanlarına steril gazlı bez üzerine yayıldıktan sonra uygulanır.

Postoperatif (ameliyat sonrası) vakalarda FURACİN'in üzerine vazelinli gazlı bez konması pansumanın yapışmasını önler ve bu şekilde pansumanın 5-7 gün açılmadan bırakılması mümkün olur. Pansuman çıkarılırken gazlı bezin serum fizyolojikle ıslatılması, çıkarılmasını kolaylaştırır.

- **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

FURACİN'in çocuklarda kullanımı ve miktarı doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda doz ayarlaması ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. FURACİN'in yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

- **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek veya karaciğer yetmezliği:**

Böbrek yetmezliğiniz varsa bu durumu doktorunuza söylemelisiniz. Böbrek yetmezliği durumlarında kullanımda dikkatli olunuz. FURACİN'in bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluğunuzu artırabilir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

*Eğer FURACİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla FURACİN kullandıysanız:**

*FURACİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**FURACİN' i kullanmayı unutursanız,**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

Eğer FURACİN uygulamayı unutursanız, hatırladığımızda derhal uygulayınız. Ancak, gelecek uygulamaya yakın bir zamanda hatırlarsanız, kaçırdığınız uygulamayı yapmadan düzenli uygulama şeklinize devam ediniz.

#### **FURACİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Tedavinizi doktorunuza bildirmeden, kendi kendinize sonlandırmayınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm diğer ilaçlar gibi, FURACİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FURACİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Cilt döküntüsü, kaşıntı ve lokal ödem (şişlik) gibi değişik derecelerde kontakt dermatit (temasla ortaya çıkan deri hastalığı) reaksiyonları
- Deride süperenfeksiyon (nitrofurazon kullanımına bağlı mantar ve bazı mikroorganizmaların (Pseudomonas da dahil olmak üzere) çoğalması ile birlikte mevcut enfeksiyonun dışında yeni enfeksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FURACİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

#### **5. FURACİN'in saklanması**

*FURACİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

FURACİN'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Güneş ışığıyla, floresan ışığıyla, alkali maddelerle ve 40°C'den yüksek ısılarla doğrudan temasından kaçınılmalıdır.

*Kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra ilacı kullanmayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FURACİN'i kullanmayınız.*

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız FURACİN'İ şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FURACİN'i kullanmayınız.

***Ruhsat sahibi:***

Zentiva Saęlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394 Şişli-İstanbul  
Tel : (0212) 339 39 00  
Faks: (0212) 339 11 99

***Üretim yeri:***

Zentiva Saęlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Küçükkanıřtıran 39780, Lüleburgaz  
Tel: (0 288) 427 10 00  
Faks: (0 288) 427 14 55

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıřtır.*