

## KULLANMA TALİMATI

**INDOCOLIR %0.1 göz damlası**  
**Göze uygulanır.**

**Etkin madde:** 5 ml damla 5 mg indometasin içerir.

**Yardımcı maddeler:** Tiyomersal, Arginin, Hidroksipropil-β-siklodekstrin, yeter miktarda hidroklorik asit ve saf su içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **INDOCOLIR nedir ve ne için kullanılır?**
2. **INDOCOLIR'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **INDOCOLIR nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **INDOCOLIR'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. INDOCOLIR nedir ve ne için kullanılır ?**

INDOCOLIR, 5 ml'lik damlalıklı polietilen şişelerde kullanıma sunulmuştur. INDOCOLIR, gözdeki iltihabı ve ağrıyı giderici bir madde içermektedir.

Bunlara dayanarak, INDOCOLIR;

- Katarakt ameliyatı esnasında oluşan göz bebeğinin daralmasının önlenmesinde; ameliyat sonrasında gözün ön kısmında oluşan iltihabın tedavisinde,
- Gözün ön bölümünün ilgili çeşitli ameliyatlardan sonra ilk günlerde göz ağrısının tedavisinde kullanılır.

### **2. INDOCOLIR'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **INDOCOLIR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- gebeliğinizin 6. ayından itibaren,
- Aspirin ve iltihap giderici diğer ilaçlara karşı alerjiniz var ise,
- Halihazırda mide ülseriniz var ise,

- Kanı sulandıran veya diğerk iltihap giderici ajanlar ile birlikte
- Karaciğerk ve b6brek hastalıđınız varsa kullanmayınız.

### **INDOCOLIR’i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Kanamaya eđiliminiz var ise, veya kanama zamanımı uzatan bařka ilaçları kullanıyorsanız veya aspirin gibi ilaçlar ile nefes darlıđınız oluyor ise, dikkatli olunuz.

G6zde kontakt lensler varken, ilacı uygulamayınız. Kontakt lensinizi ıkarınız, ilacı damlattıktan sonra 5 ila 15 dakika bekleyip, kontakt lenslerinizi tekrar takabilirsiniz.

G6zün iine enjeksiyon ile veya ađızdan uygulamayınız.

Aynı zamanda bařka bir g6z damlası ile tedavi gerekiyorsa, g6z damlaları en az 15 dakika ara vererek damlatınız..

“Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin iin geerliyse l6tfen doktorunuza danıřınız.”

### **INDOCOLIR’in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

INDOCOLIR’in yiyecek ve iecekler ile etkileřmesi beklenmemektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamilelikte kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emzirme d6neminde kullanılmamalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

G6z damlası damlatıldıktan sonra g6zünüzde rahatsızlık veya g6rme bulanıklıđı oluřabilir, ara ve makine kullanmak iin g6rmeniz netleřene kadar bekleyiniz.

### **INDOCOLIR’in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında 6nemli bilgiler**

INDOCOLIR’in yardımcı maddelerinden birisi tiyomersal’dır. Bu da, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

### **Diğerk ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Aynı zamanda bařka bir g6z damlası ile tedavi gerekiyorsa, g6z damlaları en az 15 dakika ara ile damlatılmalıdır. G6z damlaları dıřında bařka bir ila kullanıyorsanız doktorunuza s6yleyiniz.

Ađız yolu ile alınan kanda pıhtılařmayı 6nleyen ilaçlar (Oral antikoag6lanlar; kanam riski artıřı), g6nde 3 g veya 6zerindeki dozda alınan aspirin ve benzeri iltihap giderici ilaçlar,

(salisilatlar dahil olmak üzere diğer non-steroid anti-inflamatuarlar; mide ve barsak kanması ve ülser riski artışı), diflunisal, heparin, lityum, 15 mg / hafta veya daha yüksek dozda metotreksat ve tiklopidin) ile birlikte kullanılmamalıdır. Diüretikler (idrar söktürücü), ACE inhibitörleri(tansiyon düşürücü), haftada 15 mg'dan düşük dozlardaki metotreksat, pentoksifilin, topikal gastrointestinal preparatlar(mide asidi düzenleyiciler), zidovudin, betablokerler(tansiyon düşürücü), siklosporin, desmopressin, trombolitik(kan pıhtısı eritici) ajanlar ve intrauterin(rahim içi araç) araçlarla birlikte kullanıldığında da dikkatli olunmalıdır.

*Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. INDOCOLIR nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuzun önerisine uygun olarak kullanınız.

Genelde kullanılan doz; günde 4-6 (1 damla x 4-6 kez ) damla.

Göz ameliyatlarından sonra iltihabı önlemek için tedaviye ameliyattan 24 saat önce başlanır, ve belirtiler tamamen ortadan kalkıncaya kadar günde 4-6 (1 damla x 4-6 kez ) damla kullanılır.

Ameliyat esnasındaki göz bebeği daralmasını önlemek için ameliyattan önceki gün, günde 4 damla ve ameliyattan 3 saat önce 4 damla uygulanır.

Göz ameliyatları sonrasındaki ağrı için ameliyattan sonra ilk birkaç gün, günde 4 damla (1'er damla 4 kez) kullanılır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Göze damlatılarak uygulanır. Gözün içine enjeksiyon ile veya ağızdan uygulamayınız. Şişenin ucunu göze değdirmeyiniz. Açıldıktan sonra 15 gün içerisinde kullanılmalıdır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklara ait özel çalışmalar yapılmamıştır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Herhangi bir doz ayarlaması bildirilmemiştir.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Ağır karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise kullanmayınız.

*Eğer INDOCOLIR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla INDOCOLIR kullandıysanız:**

*INDOCOLIR'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **INDOCOLIR'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

#### **INDOCOLIR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

INDOCOLIR tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir etki gözlenmemiştir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, INDOCOLIR'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, INDOCOLIR'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin INDOCOLIR'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Gözde yanma, batma ve ışığa duyarlılık olabilir.

Bunlar INDOCOLIR'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. INDOCOLIR'in saklanması**

*INDOCOLIR'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25<sup>0</sup>C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Açıldıktan sonra 15 gün içerisinde kullanılmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra INDOCOLIR'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz INDOCOLIR'i kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi:***

Bausch & Lomb Saęlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş.  
Saniye Ermutlu Sok., No: 6, Şaşmaz Plaza, Kat: 11 Daire No:22-23, Kozyataęı, Kadıköy /  
İstanbul

***Üretici:***

Laboratoire CHAUVIN / FRANSA

Bu kullanma talimatı..... tarihinde onaylanmıřtır.