

## KULLANMA TALİMATI

### TADA PLUS 30/20 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin maddeler:** Her bir film kaplı tablet 30 mg dapoksetin'e eşdeğer 33,58 mg dapoksetin hidroklorür ve 20 mg tadalafil içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat DC, kroskarmelloz sodyum, aerosil 200, magnezyum stearat, opadry II 85F205040 blue [titanyum dioksit (E 171), polietilen glikol, polivinil alkol, talk, FD&C Mavi No. 1 Alüminyum Lak (E 133), Sarı demir oksit (E172 iii)].

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **TADA PLUS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TADA PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TADA PLUS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TADA PLUS'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. TADA PLUS nedir ve ne için kullanılır?**

- TADA PLUS 30/20 mg turkuaz renkli, yuvarlak, bikonveks (dışbükey) film kaplı tabletler şeklindedir. 4 veya 8 tabletlik ambalajdadır.
- TADA PLUS, etken madde olarak tadalafil ve dapoksetin içerir:
  - Tadalafil, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Cinsel uyarıyı takiben tadalafil, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa, TADA PLUS yardımcı olmayacaktır.
  - Dapoksetin bir seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI)'dür ve "diğer ürolojik ilaçlar" olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaçtır. Dapoksetin sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kırıklığı ve sıkıntılarınızı azaltır.
- TADA PLUS 18-64 yaşları arasındaki erkeklerde, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması (erektil disfonksiyon) ve/veya eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumlarında kullanılan bir ilaçtır.
  - Erken boşalma, çok az cinsel uyarılma ile erkek cinsel organı penisin, kadın cinsel organı vajinaya girmesinden hemen önce, girer girmez ya da girmesinden kısa bir süre sonra, henüz erkeğin gerçekleşmesini arzulamasından önce boşalmanın gerçekleşmesi şeklinde görülen yaygın bir cinsel işlev bozukluğudur.
  - Vajina içinde boşalma süresi iki dakikadan az olan hastalarda kullanılır.
  - Son 6 aydaki cinsel birleşme girişimlerinin çoğunda erken boşalma hikayesi olan hastalarda kullanılır.
- Cinsel uyarının olmadığı durumlarda TADA PLUS'ın tek başına işe yaramayacağı önemle not edilmelidir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir.

## **2. TADA PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **TADA PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Size uzman doktor tarafından erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa,

- Esrar ya da kokain gibi maddelere bağımlıysanız,
- Dapoksetine, tadalafile ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye alerjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,
- Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp krizi geçirdiyseniz,
- Felç geçirdiyseniz,
- Tansiyonunuz çok düşükse ya da kontrol altına alınamamış yüksek tansiyonunuz varsa,
- “Göz felci” olarak da tanımlanan non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle görme kaybınız olduysa,
- Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit içeren ilaçlar kullanıyorsanız [Bu grup ilaçlar (nitratlar), göğüs ağrısı (anjina pectoris) tedavisinde kullanılmaktadır],
- Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, dikkati odaklamada güçlük ya da yerinde duramamaya seyreden bir durum), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorunuz olmuşsa,
- Senkop (bayılma),
- 18 yaş altındaysanız,
- Kadınsanız.

**Aşağıdaki durumlarda TADA PLUS’ı kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.**

- Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz.
- Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği (orak hücre anemisi), kemik iliği kanseri (multipl miyelom), kan hücrelerinin kanseri (lösemi) veya peniste biçim bozukluğunuz varsa.
- Herhangi bir karaciğer ya da böbrek sorunuz varsa;
- Tedaviyle kontrol altında olan bir epilepsi (sara) hastasıysanız;
- Erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunuzun tedavisi için başka ilaç kullanıyorsanız.

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz), TADA PLUS almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

**TADA PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız, uzun bir süredir

terlemekteseniz ya da ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa vücudunuz susuz kalmış olabilir.

- TADA PLUS bayılmanıza neden olabilir; bayılma ya da bayılma sonucu hasar görme riskini azaltmanız için:
  - TADA PLUS'ı en az tam olarak dolu bir bardak suyla içiniz.
  - Zaten yatar durumdaysanız ya da oturuyorsanız ayağa kalkmayınız. Oturuyorsanız başınız dizlerinizin arasında tutacak şekilde aşağı doğru eğiniz.
  - Baş dönmesi, sersemlik hali, terleme, üşüme, gözlerde kararma, bulantı, sendeleme gibi belirtiler oluşur ve kendinizi iyi hissetmezseniz, hemen uzanıp kol ve bacaklarınızı yukarı kaldırarak ve başınızın vücudun diğer bölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayarak bir bayılma nöbeti geçirmekten ya da bayılırsanız yaralanmaktan kendinizi koruyunuz.
  - TADA PLUS kullandığınız gün yatar veya oturur durumdan ayağa kalkarken yavaş ve dikkatli olunuz.
  - Bu tür belirtiler hissediyorsanız kesinlikle araç ya da makine kullanmayınız.
  - Alkolle birlikte kullanmayınız.
  - Bu tür yan etkilerden herhangi birini görürseniz doktorunuza söyleyiniz.
- Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından, kalp probleminiz varsa doktorunuza bilgilendirmelisiniz.
- Bel ve leğen kemiğinin içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim (pelvik cerrahi) veya prostat bezinin etrafındaki bazı dokularla birlikte alınması olarak tanımlanan, sinirin korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda TADA PLUS'ın etkili olup olmadığı bilinmemektedir.
- Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadığınız, TADA PLUS kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

### **TADA PLUS'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

- TADA PLUS'ı a veya tok karnına alabilirsiniz.
- TADA PLUS, en az tam olarak dolu bir bardak suyla iilmelidir.
- Alkol ile beraber TADA PLUS kullanmayınız. TADA PLUS kullanırken, günde 2 alkollü iecekten fazlasını almayınız. Alkolle birlikte kullanımının etkileri iin, blm 3'e bakınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

TADA PLUS yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

TADA PLUS yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

TADA PLUS bazı kiřilerde uyku hali, bař dnmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati toplamada glk ya da grmede bulanıklıęa neden olabilir. Sizde bu trden ya da benzeri etkiler grlrse, ara ve makine kullanmamalısınız. TADA PLUS ile birlikte alkol kullandıysanız ara ve makine kullanmamalısınız.

### **TADA PLUS'ın ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

TADA PLUS, laktoz iermektedir. Eęer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduęu (dayanıksız olduęunuz) sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Bu tıbbi rn her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma baęlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

### **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

TADA PLUS, dięer ilalarla etkileřime girebilir. TADA PLUS'ı, doktor ya da eczacınız onaylamadıęı srece bařka ilalarla birlikte almayınız.

zellikle nitratlarla [gęs aęrısının (anjina aęrısı) tedavisinde kullanılır] tedavi gryorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı ilgilendirmeniz ok nemlidir; nk nitratlarla birlikte TADA PLUS kullanmamalısınız.

TADA PLUS ile birlikte kullanılmaması gereken dięer ilalar ařaęıda listelenmiřtir:

- Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitr (monoamin oksidaz inhibitr) olarak adlandırılan trden ilalar

- Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
- Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
- Lityum - bipolar hastalık tedavisinde kullanılır.
- Linezolid – iltihaplı durumları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.
- Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.
- Sarı kantaron (St.John's Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır.
- Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.
- Migren tedavisi için kullanılan ilaçlar

Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, TADA PLUS kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, TADA PLUS kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde TADA PLUS kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, TADA PLUS'ı kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir.

TADA PLUS ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

- Yüksek tansiyon (alfa blokör), büyümüş prostat bezi (tamsulosin) veya sertleşme sorununu tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar
- Depresyon dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
- İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı kullanılan steroid olmayan ilaçlar
- Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar
- CYP3A4 adı verilen bir enzimi etkisiz hale getiren ilaçlar (örneğin ketokonazol veya HIV tedavisi için proteaz inhibitörleri)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. TADA PLUS nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

TADA PLUS tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

TADA PLUS'ın olağan dozu, gereksinim halinde cinsel birleşmeden 1 ila 3 saat önce alınan 1 tablettir. TADA PLUS 30/20 mg, günde 1 tablettten daha fazla alınmamalıdır.

TADA PLUS, tableti aldıktan 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda TADA PLUS'ın etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve

partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir.

Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer TADA PLUS aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini artıracığından, fazla alkol alımından (günde 2 alkollü içecekten fazlası) kaçınınız.

TADA PLUS'ı günde bir defadan fazla ALMAMALISINIZ. TADA PLUS, cinsel aktivite öncesinde kullanılmak için tasarlanmıştır; sürekli günlük kullanımı önerilmez.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

TADA PLUS'ı en az bir tam dolu bardak suyla içiniz; bu önlemlerle "bayılma" durumuna engel olabilirsiniz (bakınız "bayılma ve düşük kan basıncı").

Tabletleri kırmadan, ezmeden ve çiğnmeden yutunuz.

TADA PLUS yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

65 yaşın altındaki bireylerde, erişkinlerdeki gibi kullanılır.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek yetmezliği:**

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez.

#### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği durumunda, TADA PLUS 30/20 mg'ın kullanımı önerilmez.

*Eğer TADA PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla TADA PLUS kullandıysanız:**

*TADA PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**TADA PLUS'ı kullanmayı unutursanız:**

TADA PLUS ancak gerektiğinde alınan bir ilaç olduğundan, kullanmayı unutmanız durumunda herhangi bir soruna yol açmaz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**TADA PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Yapılan çalışmalarda 2 ay süreyle her gün kullanmasalar bile dapoksetin kullanan bazı hastalarda, ilacı bıraktıklarında uykuya dalmada güçlük ve baş dönmesi bildirilmiştir. Her gün almasanız da ilacı kullanmayı bıraktığınızda sizde de böyle belirtiler oluşabilir. Tadalafil ile ilgili veri bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, TADA PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, TADA PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik reaksiyon (döküntü ve kurdeşen dahil)
- Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz
- Ayağa kalktığınızda sersemlik hissederseniz
- Mizacınızda herhangi değişiklik hissederseniz
- İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız
- Görmede bulanıklık
- Göz kapaklarının şişmesi
- Göz ağrısı ve gözde kızarıklık
- Bayılma
- Yüzün şişmesi
- 4 saatten daha uzun süren uzamış ve ağrılı sertleşme
- Tek veya iki gözde, görme yeteneğinde kısmi, ani, kalıcı veya geçici azalma ya da görme kaybı
- Göğüs ağrısı (Cinsel aktivite sırasında veya sonrasında göğüs ağrısı olursa nitrat KULLANILMAMALIDIR.).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.



## **Bayılma ve düşük kan basıncı**

TADA PLUS ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için:

- TADA PLUS'ı en az bir tam dolu bardak suyla içiniz.
- İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu durumlarda susuz kalmış olabilir:
  - İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız
  - Uzun bir süredir terlemekteyseniz
  - Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa
- Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibi belirtiler oluşması durumunda, hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuz ve belirtiler düzeline kadar böyle kalınız. Bu, sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten ya da bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır.
- Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız, hemen ayağa kalkmayınız.
- Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.
- Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kalbin hızlı atması
- Yüksek tansiyon veya düşük tansiyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilere sebep olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Çok yaygın görülenler:

- Baş dönmesi, sersemlik hali, gözlerde kararma
- Baş ağrısı
- Kendinizi hasta gibi hissetme (bulantı)

Yaygın görülenler:

- Mide ağrısı, şişkinlik ya da kendinizi hasta gibi hissetme (kusma)

- Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama
- Karıncalanma hissi
- Terlemede artış, al basması, sıcak basması
- İshal, kabızlık
- Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk
- Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme
- Halsizlik, yorgunluk ya da uykuya meyil, esneme
- Burunda tıkanıklık
- Dikkati toplama güçlüğü
- Titreme
- Cinsel istekte azalma
- Kulaklarda çınlama
- Hazımsızlık
- Ağız kuruluğu
- Sırt ağrısı
- Kas ağrıları
- Yüzde kızarma

Yaygın olmayan sıklıkta görülenler:

- Bayılma (“4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız).
- Reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması)
- Çarpıntı hissi

Seyrek görülenler:

- Geçici hafıza kaybı
- İşitmede ani azalma veya kayıp
- Burun kanaması
- Tadalafil kullanan erkeklerde kalp krizi ve felç bildirilmiştir. Bu belirtileri gösteren erkeklerin hepsinde olmamakla birlikte çoğunda, bu ilacı almadan önce de kalp rahatsızlığı olduğu bilinmektedir. Bu belirtilerin doğrudan tadalafil kullanımıyla alakalı olup olmadığını tespit etmek mümkün değildir.

Tadalafil kullanan erkeklerde, klinik araştırmalarda görülmeyen bazı başka yan etkiler olmuş; ve bunların görülme sıklığının seyrek olduğu tahmin edilmiştir:

- Migren
- Ciddi deri döküntüleri
- Göze kan akışını etkileyen bazı bozukluklar
- Düzensiz kalp atışı ve kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu meydana gelen geçici göğüs ağrısı (anjina)
- Ani kardiyak ölüm

Bir hayvan türünde, üreme bozukluğuna işaret edebilecek etkiler görülmüştür. Her ne kadar bazı erkeklerde sperm yoğunluğunda bir azalma görülse de, erkeklerde yapılan sonraki çalışmalar, insanlar üzerinde bu etkinin olmadığını göstermiştir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. TADA PLUS’ın Saklanması**

*TADA PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra TADA PLUS’ı kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TADA PLUS’ı kullanmayınız.*

***Ruhsat Sahibi:*** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü  
Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3  
Esenler/İSTANBUL  
Tel: 0 850 201 23 23  
Faks: 0 212 482 24 78  
e-mail: bilgi@neutec.com.tr

***Üretim Yeri:*** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 11.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.*