

## KULLANMA TALİMATI

### NASOVINE PEDIATRİK Burun Spreyi

**Burun deliklerine uygulanır.**

- **Etkin madde:** Her 1 ml'sinde 0.5 mg ksilometazolin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Benzalkonyum klorür, disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, EDTA, sodyum klorür, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde çocuğunuzun bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında çocuğunuza önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **NASOVINE PEDIATRİK nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NASOVINE PEDIATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NASOVINE PEDIATRİK nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NASOVINE PEDIATRİK'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. NASOVINE PEDIATRİK nedir ve ne için kullanılır?**

- NASOVINE PEDIATRİK, etkin madde olarak her 1 ml'sinde 0.5 mg (%0.05) ksilometazolin hidroklorür içeren, burun spreyi formunda bir ilaçtır.

- NASOVINE PEDİATRİK, burun tıkanıklığını hızla gideren, burun kan damarlarını daraltarak etki gösteren bir ilaç olup, dekonjestan olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- NASOVINE PEDİATRİK, doz ayarlı 10 ml'lik sprey ile kullanıma sunulmaktadır.
- NASOVINE PEDİATRİK, burun tıkanıklığını hızla açar ve daha rahat nefes alınmasını sağlar. Soğuk algınlığı, saman nezlesi veya diğer alerjik akıntılar ve sinüzitten kaynaklanan burun tıkanıklığının giderilmesinde kullanılır.
- Etkisi birkaç dakika içinde başlar ve 12 saate kadar devam eder. Burun içi hassasiyeti olan kişiler tarafından da iyi tolere edilmektedir.

**2. NASOVINE PEDİATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**  
**NASOVINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer çocuğunuzun:

- Ksilometazolin hidroklorüre, diğer burun açıcı ilaçlara (adrenerjik ilaçlar) veya NASOVINE PEDİATRİK'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjisi varsa,
- Yakın zamanda burun ile ilgili (trans-nazal) bir ameliyat geçirdiyse
- Tansiyonu yüksekse
- Kalp hastalığı varsa
- Tiroid bezleri fazla çalışıyorsa (hipertroidi)
- Şeker hastalığı varsa
- Feokromastom hastasıysa
- Göz tansiyonu (glokom) varsa
- Burun mukozasında rinitis sicca denilen özel bir iltihabi durum varsa
- 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

## **NASOVINE’i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Eđer çocuđunuz ila alıyorsa, OTRİVİNE PEDİATRİK kullanmadan nce doktorunuza danıřınız.
- Prostat bymesi varsa dikkatli kullanınız.

Diđer burun aıcı ilalarda olduđu gibi, NASOVINE PEDİATRİK, ok duyarlı hastalarda uyku bozuklukları, sersemlik, titremeye neden olabilir. Byle bir durumla karřılařırsanız ilacın kullanımını durdurunuz ve doktorunuza danıřınız.

Her NASOVINE PEDİATRİK kutusu herhangi bir apraz enfeksiyonu nlemek iin sadece bir kiři tarafından kullanılmalıdır.

Diđer burun aıcı ilalarda olduđu gibi, NASOVINE PEDİATRİK de 5 gnden daha uzun sreli devamlı olarak kullanılmamalıdır. Eđer belirtiler devam ederse, doktorunuza danıřınız. Uzun sreli veya ařırı dozda kullanıldıđında yeniden burun tıkanıklıđı oluřmasına neden olabilir.

NASOVINE PEDİATRİK 2 yařın altındaki ocuklarda kullanılmamalıdır. 2–6 yař aralıđındaki ocuklarda doktor nerisiyle yetiřkin kontrolnde kullanılabilir.

nerilen dozu ařmayınız.

NASOVINE PEDİATRİK hijyenik nedenlerle aıldıktan sonra 28 gnden fazla kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **NASOVINE PEDİATRİK’in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

- Geerli deđildir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

- Geçerli değildir.

## **Araç ve makine kullanımı**

NASOVINE PEDİATRİK tedavisinin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

## **NASOVINE PEDİATRİK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

NASOVINE PEDİATRİK, verilen doz başına 10 mg'dan daha az benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür, deride tahrişe sebep olabilir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer çocuğunuz depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri, trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar) alıyorsa, bu tür ilaçlar NASOVINE PEDİATRİK'in etkilerini arttırabileceğinden, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

*Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandı ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. NASOVINE PEDİATRİK nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. 2–12 yaş aralığındaki çocuklarda yetişkin kontrolünde kullanılabilir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:


2–6 yaş aralığındaki çocuklarda:

Günde 1–2 kez, her bir burun deliğine 1 defa püskürtülür; günlük toplam uygulama sayısı 2'yi geçmemelidir. Mutlak doktor önerisiyle kullanılabilir.

6–12 yaş aralığındaki çocuklarda:

Günde 1–2 kez, her bir burun deliğine 1–2 defa püskürtülür; günlük toplam uygulama sayısı 2'yi geçmemelidir.

### Uygulama yolu ve metodu:



1. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız.
2. Birinci uygulamadan önce, sprey bir defa havaya dağılana kadar, birkaç pompalama hareketi yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz. Daha sonraki kullanımlarınızda buna ihtiyaç yoktur ve spreyi hemen kullanabilirsiniz.
3. Çocuğunuzun burnunu temizleyiniz. İleriye doğru hafifçe eğiniz ve başlığı burun deliğine yerleştiriniz.
4. Spreyin en uygun şekilde dağılmasını sağlamak için pompayı bastırırken aynı anda nefes almasını sağlayınız.
5. Diğer burun deliği için aynı işlemi tekrarlayınız.
6. Kullanımdan sonra kapağı kapatınız.

Ölçülü doz veren sprey, her defasında tam doz uygulamanızı ve NASOVINE PEDIATRİK'in çocuğunuzun burnunun iç yüzeyinize iyice dağılmasını sağlar.

### Değişik yaş grupları:

NASOVINE PEDIATRİK, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 2–6 yaş aralığındaki çocuklarda mutlak doktor önerisiyle kullanılabilir. 6–12 yaş aralığındaki çocuklarda yetişkin kontrolünde kullanılabilir.

### Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

*Eğer NASOVINE PEDIATRİK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla NASOVINE kullandıysanız:**

*NASOVINE PEDIATRİK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**NASOVINE PEDIATRİK'i kullanmayı unutursanız:**

Eğer NASOVINE PEDIATRİK'in bir dozunu almayı unutursanız ve bir saat içinde hatırlarsanız hemen kullanınız. Ancak daha uzun sürede hatırlarsanız, dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, NASOVINE PEDIATRİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa NASOVINE PEDIATRİK'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları (yüzde ve boğazda şişme (anjiyoödem), ciltte döküntü, kaşıntı gibi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun NASOVINE PEDIATRİK'e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kalp atışlarınızda düzensizlik veya hızlanma
- Geçici görme bozukluğu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Baş ağrısı

Bulantı

Burun mukozasında kuruluk veya rahatsızlık, yanma hissi Bunlar NASOVINE PEDİATRİK'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. NASOVINE PEDİATRİK'in saklanması**

*NASOVINE PEDİATRİK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

NASOVINE PEDİATRİK'i sıcaktan koruyunuz. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NASOVINE PEDİATRİK'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NASOVINE PEDİATRİK'i kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi :*** Avixa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Esenler-İSTANBUL

***Üretim Yeri :*** Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Esenyurt İstanbul

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*