

## KULLANMA TALİMATI

### SYNPİTAN FORTE 5 I.U./ml İ.M./İ.V. ampul

Enjeksiyon yoluyla uygulanır.

*Etkin madde:* 5 ünite (IU) oksitosin (sentetik)

*Yardımcı madde(ler):* Klorbutanol, sodyum klorür, asetik asit, enjeksiyonluk su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. *SYNPİTAN FORTE nedir ve ne için kullanılır?*
2. *SYNPİTAN FORTE'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *SYNPİTAN FORTE nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *SYNPİTAN FORTE'un saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. SYNPİTAN FORTE nedir ve ne için kullanılır?**

SYNPİTAN FORTE, ampul içerisinde renksiz, karakteristik kokulu berrak çözelti şeklinde sunulan bir üründür. Yapay oksitosin hormonu içermektedir. 1 mL'lik 3, 6 ve 50 ampul içeren ambalajlarda sunulur.

Bu hormon rahimin kasılmasını sağlamaktadır. SYNPİTAN FORTE aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

- Doğum başlangıcı veya doğum sırasındaki kasılma yetersizlikleri

- Sezaryen ile doğumdan sonra (rahimin kısa sürede toplanmasını sağlamak için)
- Doğum kanamaları ve doğum sonrası rahim kasında gevşeme

## **2. SYNPIŦAN FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **SYNPIŦAN FORTE’u ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eđer;

- Sentetik oksitosine ya da SYNPIŦAN FORTE’un ierisinde bulunan diđer maddelerden herhangi birine karřı ařırı duyarlılıđınız (alerjiniz) varsa
- Bebeđin bařının byklđ ile annenin leđen blgesi arasında belirgin uyumsuzluk varsa
- Bebeđin pozisyonunun uygun olmaması veya bebeđin yan gelmesi gibi pozisyonda deđiřiklik yapılmadan dođumun imkansız olduđu durumlar varsa
- ocuk veya anne iin, fayda/risk deđerlendirmesi sonucu gerekli grlen acil dođum mdahaleleri gerekiyorsa
- Dođumun yakın olmadıđı bir durumda bebeđin kalp sesleri bozulduysa,
- Rahimin ařırı gerilimli olması durumunda
- Kanda zararlı maddelerin ařırı artması ile belirgin bir durum (ađır toksemi) varlıđı
- Ađrıyı bařlatmak iin ila uzun sreli kullanıldıđı durumlar
- Normal dođumun yapılamadıđı durumlar
- Kordonun sarkması veya kordonun nden gelmesi
- Plasentanın rahime anormal tutunması (plasenta previa) ve plasentadan bebeđe uzanan kordon damarlarının yerleřiminde bir bozukluk olan “vasa previa” varsa,
- Plasentada ayrılma
- oklu gebeliklerde olduđu gibi yırtılmaya karřı rahim direncinde bozulma veya rahimde gerginleřme varsa,
- Polihidramniyoz (amniyon sıvısının hacminin fazla olması)
- Fazla sayıda bebeđe birden gebelik
- Klasik sezaryen dahil olmak zere byk cerrahi giriřim sonucu oluřan rahim yarası varlıđı

SYNPIŦAN FORTE ayrıca oksitosine-direnli rahim hareketsizliđi, řiddetli pre-eklamptik toksemi (bu rahatsızlık yksek tansiyon, idrarda protein ıkması ve vcutta řiřlikler ile belirgindir) ve řiddetli kalp-damar bozukluklarında uzun sreli kullanılmamalıdır. SYNPIŦAN FORTE’u doktor uygun grrse size uygulayacaktır.

### **SYNPİTAN FORTE’u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

SYNPİTAN FORTE size doktor kontrolünde verilecektir. Herhangi bir istenmeyen durumun ortaya ıkması halinde duruma gerekli mdahalelerin yapılamayacağı yerlerde SYNPİTAN FORTE uygulanmamalıdır.

Ařađıdakilerden herhangi biri sizin için geerli ise SYNPİTAN FORTE kullanmadan nce doktorunuza syleyiniz:

- Daha nce sezaryen ameliyatı geirdiyseniz.
- Son 6 saat ierisinde dođumu bařlatmak iin kullanılan diđer ilalardan herhangi biri (r. prostaglandinler denilen ilalar) size verildiyse.
- 35 yařın zerindeyseniz.
- Yksek tansiyon veya herhangi bir kalp rahatsızlıđınız var ise.
- Bir sre nce gtl kasılan rahminiz řimdi daha gsz kasılmaya bařladıysa.
- Eđer doktorunuz basen blgenizin kklđ nedeniyle normal dođumun sizin iin zor olabileceđini sylediyse.

Ařađıdaki durumlardan herhangi biri sizin iin geerliyse SYNPİTAN FORTE’u uzun sre kullanmamalısnız:

- Tedaviye rađmen kasılmalarınız artmıyorsa.
- řiddetli pre-eklamptik toksemi denilen bir rahatsızlıđınız var ise (bu rahatsızlık yksek tansiyon, idrarda protein ıkması ve vcutta řişlikler ile belgindir).
- Kalp ve kan dolařımı ile ilgili ciddi bir rahatsızlıđınız var ise.

Eđer oksitosine karřı duyarlılıđınız var ise řiddetli kasılmalar meydana gelebilir.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **SYNPİTAN FORTE’un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Sıvı tketiminizi en aza indirmeniz sylenebilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

SYNPİTAN FORTE uygun şekilde kullanıldığında bebeğe zarar verecek bir etki göstermesi beklenmemektedir. SYNPİTAN FORTE, yeni doğan bebeğe zarar vermez.

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız*

SYNPİTAN FORTE düşük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. SYNPİTAN FORTE, yeni doğan bebeğe zarar vermez.

### **Araç ve makine kullanımı**

SYNPİTAN FORTE doğum sancularına neden olabilir. Sancısı olan kadınların araç ve makine kullanmaması gerekir.

### **SYNPİTAN FORTE'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün her 1 mL'lik dozunda 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

SYNPİTAN FORTE ile birlikte aşağıdaki ilaçları kullanırken dikkatli olunmalıdır:

- Siklopropan veya halotan gibi solunum yoluyla kullanılan anestezi ilaçları SYNPİTAN FORTE'un etkisini azaltabilir ve tansiyon düşürücü etkisini artırabilir. Ayrıca bu ilaçların birlikte kullanımları kalpte ritim bozukluklarına neden olabilir.
- Peridural anestezi (omurga boşluğuna yapılan anestezi) sırasında veya sonrasında SYNPİTAN FORTE, semptomimetik ilaçlar denilen ilaçların damarları daraltıcı etkisini artırabilir.
- Prostaglandin türü ilaçlar (hormon benzeri bir madde) ile birlikte SYNPİTAN FORTE kullanıldığında bu ilaçlar birbirlerinin etkisini artırabilmektedir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. SYNPİTAN FORTE nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz durumunuza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

SYNPİTAN FORTE seyreltilerek damlalar halinde damardan enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

SYNPİTAN FORTE çocuklarda kullanılmamaktadır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

SYNPİTAN FORTE yaşlılarda kullanılmamaktadır.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek/karaciğer yetmezliği:**

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise doktorunuz ile konuşmalısınız.

*Eğer SYNPİTAN FORTE'un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla SYNPİTAN FORTE kullandıysanız:**

Doktorunuz SYNPİTAN FORTE'u doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uygulamamalısınız.

**SYNPİTAN FORTE'u kullanmayı unutursanız**

Doktorunuz SYNPİTAN FORTE'u doğru şekilde almanızı sağlayacaktır.

**SYNPİTAN FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

SYNPİTAN FORTE kullanımının ardından olumsuz bir etki beklenmemektedir. Doktorunuz durumunuzu takip edecektir.

**4. Olası yan etkileri nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi SYNPİTAN FORTE'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Rahimin ilaca karşı hassasiyeti kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle normalde düşük doz olarak nitelendirilen dozlarda da rahimde spazm (kasılma) ortaya çıkabilmektedir. Aşırı dozlar, rahimin aşırı uyarılmasına ve dolayısıyla bebekte sıkıntılar oluşmasına, boğulma ve ölüme sebep olabilir veya aşırı kasılmalar, yumuşak doku hasarı ve rahimin yırtılması ile sonuçlanabilir.

Yüksek dozda SYNPIATAN FORTE büyük miktarlarda elektrolitsiz sıvı ile birlikte uzun süre, uygulandığı zaman annede ve bebekte sodyum azalmasına bağlı olarak "su zehirlenmesi" denilen bir duruma yol açabilmektedir. Bu durum, istemsiz kasılmalar, koma ve hatta annenin ölümü ile sonuçlanabilir. Su zehirlenmesinin belirtileri şunlardır:

- Baş ağrısı, iştah kaybı, bulantı, kusma ve karın ağrısı.
- Uyuklama/uyuşukluk, sersemlik, bilinç kaybı ve grand-mal tipi nöbetler (epilepsi benzeri nöbetler).
- Kandaki elektrolit miktarında azalma.

Damar içine hızlı şekilde enjekte edildiğinde yüzde kızarma ile geçici ani hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü) ve refleks taşikardi (kalbin atım sayısında artma) gözlenebilir.

SYNPIATAN FORTE bazen bulantı, kusma, kanama veya kalpte ritm bozukluğuna neden olmaktadır. Leğen bölgesinde hematoma (kan birikimi) olabilir. Cilt döküntüleri ve solunum güçlüğü, tansiyonda düşme veya şoku içeren ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

Aşağıda sıklıklarına göre verilen istenmeyen etkiler şu şekilde derecelendirilmiştir:

Çok yaygın :	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın :	10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın olmayan :	100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Seyrek :	1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Çok seyrek :	10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Bilinmiyor :	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

#### **Bağışıklık sistemi bozuklukları:**

Seyrek: Solunum güçlüğü, tansiyonda düşme, şok dahil ciddi alerjik reaksiyonlar

#### **Sinir sistemi bozuklukları:**

Yaygın: Baş ağrısı

#### **Kalp bozuklukları:**

Yaygın: Taşikardi (kalbin atım sayısında artma), bradikardi (kalbin atım sayısında azalma)

Yaygın olmayan: Kalpte ritm bozukluğu

#### **Sindirim sistemi bozuklukları:**

Yaygın: Bulantı, kusma

**Deri ve deri altı dokusu bozuklukları:**

Seyrek: Döküntü

Ayrıca bebekte bildirilen yan etkiler şunlardır:

Bradikardi (kalbin atım sayısında azalma), kalpte ritm bozuklukları, merkezi sinir sisteminde kalıcı harabiyet ve bebeğin ölümü, bebeğin yaşamsal faaliyetlerinin ölçülmesi için kullanılan Apgar puanında (yenidoğanın yaşamsal fonksiyonlarını ölçen puanlandırma sistemi) 5 dakika içinde düşme, yeni doğan sarılığı, retina (gözün ağ tabakası) kanamasıdır.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. SYNPIŦAN FORTE'un saklanması**

*SYNPIŦAN FORTE'u çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Preparatı 2-8°C'de saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYNPIŦAN FORTE'u kullanmayınız.*

Eđer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYNPIŦAN FORTE'u kullanmayınız.

**Ruhsat sahibi:**

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

**İmal yeri:**

MEFAR İLAÇ SAN. A.Ş.

Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No: 81

34873 Kartal/İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*

**AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ  
İÇİNDİR**

İV oksitosin infüzyonu uygulanan bütün hastalar, bu ilaç hakkında geniş bilgiye sahip ve komplikasyonları tanıyabilecek sağlık personelinin gözetimi altında olmalıdır. Herhangi bir komplikasyon durumunda müdahale edebilecek doktorun bulunmadığı durumlarda oksitosin uygulaması yapılmamalıdır.

SYNPİTAN FORTE parenteral yol (İV infüzyon) ile uygulanmaktadır.

İV infüzyon, oksitosin ihtiva etmeyen bir çözelti ile başlatılmalıdır. Bazı çok özel haller dışında fizyolojik infüzyon çözeltileri kullanılmalıdır. İnfüzyon şişesi çalkalanarak çözeltilerin iyi karışması sağlanır (10 mIU/mL). Bu çözelti hastaya infüzyon hızı tam olarak kontrol edilerek (örneğin sabit bir infüzyon pompası ile) verilmelidir.