

## KULLANMA TALİMATI

**TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup**

**Ağızdan alınır.**

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat
- **Yardımcı maddeler:** Nipajin M , sodyum sakarin, mandalina aroması, gliserin, sorbitol ve distile su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***TUSAMOL nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***TUSAMOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***TUSAMOL nasıl kullanılır?***
4. ***Olasıyan etkiler nelerdir?***
5. ***TUSAMOL'ün saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. TUSAMOL nedir ve ne için kullanılır?**

TUSAMOL, 100 ml'lik renkli şişede, 5 ml'lik 1, 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan şuruptur.

TUSAMOL etkin madde olarak butamirat sitrat içerir.

Ani başlayan öksürük ve cerrahi girişimler için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi için kullanılır.

#### **2. TUSAMOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**TUSAMOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Butamirat sitrata veya TUSAMOL'ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

## **TUSAMOL'ü ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Hamileliđinizin ilk üç ayında doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **TUSAMOL'n yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

#### **Hamilelik:**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Gerekli olduđu durumlarda doktorunuzun kontrol altında kullanınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

#### **Emzirme:**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

TUSAMOL'n anne stne geip gemediđi bilinmediđinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danıřınız.

#### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hibir alıřma yapılmamıřtır. Butamirat sitrat, bař dnmesine sebep olabileceđinden, ara ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

#### **TUSAMOL'n ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

İeriđinde bulunan Sorbitol nedeniyle, eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıđınız olduđu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

TUSAMOL, 5 ml'lik dozunda 10 g'dan daha az gliserin ierir. Gliserin'e karřı herhangi bir etki beklenmez.

TUSAMOL'n 5 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ( 0,25 mg sodyum sakarin) ierir. Sodyum miktarına bađlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

#### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

TUSAMOL'n herhangi bir ilala etkileřimde bulunduđuna dair kanıt yoktur.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. TUSAMOL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

- TUSAMOL yetiřkinlerde, yemeklerden nce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, gnde 4 defa 3 lek (15 ml) olmak zere kullanılır.
- Doktor tarafından bařka bir řekilde tavsiye edilmediđi takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

- TUSAMOL sadece ağızdan kullanım içindir.
- Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanım:**

3 yaşın üstündeki çocuklarda	: Günde 3 defa 5 ml (1 ölçek)
6 yaşın üstündeki çocuklarda	: Günde 3 defa 10 ml (2 ölçek)
12 yaşın üstündeki çocuklarda	: Günde 3 defa 15 ml (3 ölçek)

**Yaşlılarda Kullanım:**

TUSAMOL'ün yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

**Özel kullanım durumları****Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

TUSAMOL'ün böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

*Eğer TUSAMOL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla TUSAMOL kullandıysanız:**

*TUSAMOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme.

**TUSAMOL'ü kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**TUSAMOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, TUSAMOL 'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, TUSAMOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :**

- Deri döküntüleri

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eđer bu yan etki sizde mevcut ise sizin TUSAMOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Hafif deri döküntüsü

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Mide bulantısı,
- İshal
- Baş dönmesi

Bunlar TUSAMOL'ün hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

##### **5. TUSAMOL'ün Saklanması**

*TUSAMOL'ü çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TUSAMOL' kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TUSAMOL'ü kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi :** Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.  
Acıbadem, Köftüncü Sok. No : 1  
34718 Kadıköy / İSTANBUL

**Üretici :** Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.  
Acıbadem, Köftüncü Sok. No : 1  
34718 Kadıköy / İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 02.03.2010 tarihinde onaylanmıştır.*