

KULLANMA TALİMATI

LIQUIFILM TEARS ocular lubricant Göze uygulanır.

- **Etkin maddeler:** Bir ml çözelti, % 1.4 Polivinil alkol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Klorobütanol hidrus, sodyum klorür, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **LIQUIFILM TEARS nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **LIQUIFILM TEARS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **LIQUIFILM TEARS nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir ?**
5. **LIQUIFILM TEARS'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. LIQUIFILM TEARS nedir ve ne için kullanılır ?

LIQUIFILM TEARS, şişe içerisinde 15 ml göz damlası kullanıma sunulmuş olan ve gözdeki kuruluğu ve tahrişi kontrol etmek için kullanılan bir göz damlasıdır. LIQUIFILM TEARS'ın içindeki etkin madde polivinil alkol, göz yüzeyini nemlendirip kayganlaştırmaktadır. Böylelikle göz kuruluğunu ve tahrişi önlemek için ve sert kontakt lenslerin gün boyunca daha rahat ve daha uzun süre kullanılmasını sağlamak üzere kullanılmaktadır.

2. LIQUIFILM TEARS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

• LIQUIFILM TEARS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

• LIQUIFILM TEARS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Gözünüzde yumuşak kontakt lens varken kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LIQUIFILM TEARS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

LIQUIFILM TEARS'in herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

LIQUIFILM TEARS bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini bekleyiniz.

LIQUIFILM TEARS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel uyarı gerektiren herhangi bir ayırt edici özelliğe sahip bir madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka bir ilaç kullanıyorsanız, her uygulama arasında 15 dakika bekleyiniz.

Topikal kullanım ile ilgili herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LIQUIFILM TEARS nasıl kullanılır ?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :**

İhtiyaç oldukça veya tarif üzerine her bir göze 1-2 damla damlatılır.
Eğer tahriş devam ederse kullanıma son vererek doktorunuza danışınız.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Alt göz kapağı aşağıya çekilerek damlatılır.
Mikrop bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu hiçbir yere değdirmeyiniz.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlara uyunuz.

Şişe açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır

İlacınızı almayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı: Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı: Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır..

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer LIQUIFILM TEARS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LIQUIFILM TEARS kullandıysanız:

LIQUIFILM TEARS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LIQUIFILM TEARS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

LIQUIFILM TEARS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LIQUIFILM TEARS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LIQUIFILM TEARS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LIQUIFILM TEARS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

LIQUIFILM TEARS için bildirilmiş başka herhangi bir yan etki bulunmamaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. LIQUIFILM TEARS'ın Saklanması

LIQUIFILM TEARS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ağız sıkıca kapalı olarak 15°C – 25°C arasında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız LIQUIFILM TEARS'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LIQUIFILM TEARS'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4
Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretici:

Fransa'da Allergan Fransa SA için,
Allergan Pharmaceuticals Ltd.
Westport/İrlanda

Bu kullanma talimatı 15.07.2010 tarihinde onaylanmıştır.