

## KULLANMA TALİMATI

### NURATİN 5 mg/5mL Şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 mL şurup 5 mg loratadin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Propilen glikol, gliserin, sitrik asit anhidr, sodyum benzoat (E211), şeker, şeftali aroması, sodyum sakarin, disodyum EDTA, deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **NURATİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NURATİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NURATİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NURATİN'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. NURATİN nedir ve ne için kullanılır?**

- NURATİN'in etkin maddesi olan loratadin alerjik hastalıklarda kullanılan bir ilaçtır.
- NURATİN'in her mililitresinde 1 mg loratadin bulunur. 1 ölçekte (5 mL) 5 mg Loratadin bulunur. NURATİN, 100 mL'lik cam şişede ve 5 mL ölçekli kaşık içeren ambalajlarda bulunmaktadır.
- Uzun süre devam eden ciltte döküntü (ürtiker), mevsimsel ve uzun süreli alerjik burun akıntısı (rinit) tedavisinde kullanılır.

## 2. NURATİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### NURATİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer NURATİN şurubun bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise
- İki yaşından küçük çocuklarda

### NURATİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer ağır karaciğer yetmezliğiniz ya da böbrek yetmezliğiniz var ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### NURATİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NURATİN'in gıdalarla alınması etkisini bir miktar artırabilir. Bu yüzden yiyeceklerle birlikte almayınız.

### Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Loratadinin hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### Emzirme

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Sütünüze geçecek loratadin miktarının bebeğinize zarar vermesi beklenmez. Ama yine de emzirmekte olduğunuz bebeğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

### Araç ve makine kullanımı

NURATİN'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

### NURATİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1.155 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

NURATİN'de bulunan propilen glikolden dolayı alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

NURATİN her ölçekte (5 mL) 3 g şeker içerir. NURATİN'in iki hafta veya daha fazla süreyle kronik kullanımı halinde dişlere zararlı olabilir.

NURATİN, 5 mL'lik dozunda 10 g'dan daha az gliserin içerir. Miktarı nedeniyle gliserine karşı herhangi bir etki beklenmez.

#### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Şimdiye kadar, klinik açıdan anlamlı herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Alerji ile ilgili deri testi yapılmadan 48 saat önce NURATİN kullanımına son verilmesi gerekir. Aksi takdirde, doğru sonuç alınması engellenebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. NURATİN nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde 1 kez 2 ölçek (10 mg) kullanılır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

NURATİN şurup'u aç karnına alınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı :**

2-11 Yaş arasındaki çocuklar: Vücut ağırlığı 30 kg'ın üzerinde olan çocuklarda [6-11 yaş], günde 1 kez 2 ölçek (10 mg);

Vücut ağırlığı 30 kg'ın altında olan çocuklarda [2-5 yaş], günde 1 kez 1 ölçek (5 mg); dozunda kullanılır.

0-2 Yaş arasındaki çocuklar: 2 yaş altında kullanımı ile ilgili yeterli veri olmadığından bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

##### **Yaşlılarda kullanımı :**

Yaşlı hastalarda uzun süreli normal doz kullanımlarda kardiyolojik toksisite görülmemiştir. Yaşlı hastalarda sadece plazma klirensi ve yarılanma süresi uzayabilir bu da doz ayarlamayı gerektirmez.

#### **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek / Karaciğer yetmezliği:** Böbrek yetmezliği (GFR<30mL/dak) ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu 1 gün ara ile (48 saatte bir) 10 mg'dır.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluk olmayan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

*Eğer NURATİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla NURATİN kullandıysanız:**

NURATİN'in aşırı dozda alınması halinde kalp hızının normalin üzerinde olması (taşikardi), uyku hali ve baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir.

*NURATİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**NURATİN'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**NURATİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi NURATİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, NURATİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Hırıltı
- Nefes darlığı
- Yüzde şişme
- Derinin ve gözlerin sarılaşması (sarılık gelişmesi)
- Deri döküntüsü
- Baygınlık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NURATİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kalp atışında değişiklikler
- Nefes alıp vermede zorluk
- Sık görülen enfeksiyon belirtileri, ateş veya boğaz ağrısı gibi
- Ağız boşluğu mukozasının iltihabı (stomatit), göz akı iltihabı (konjunktivit)
- Öncesine göre daha az idrara çıkma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Baş ağrısı
- Sinirlilik
- Sakinlik (sedasyon)

- Uykusuzluk
- Yorgunluk
- Halsizlik
- Aşırı hareketlilik (hiperkinezi)
- Bulanık görme
- Kulak ağrısı
- Karın ağrısı
- İshal
- Diş bozuklukları
- Ağız kuruluğu
- Sersemlik
- Sırt ağrısı

Bunlar NURATİN'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. NURATİN'in saklanması**

*NURATİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklıklarında ve orijinal ambalajında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NURATİN'i kullanmayınız.*

#### ***Ruhsat sahibi:***

Atayurt İlaç San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.  
Bostancıyolu Cad. Keyap Çarşısı Sitesi No:100  
Yukarı Dudulu/Ümraniye - İSTANBUL

#### ***Üretici:***

Toprak İlaç ve Kimyevi Mad.San.ve Tic.  
A.Ş. TEM Otoyolu Kandaklar Mevkii  
Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 10.03.2010 tarihinde onaylanmıştır.*