

KULLANMA TALİMATI

DIPROLENE Pomat %0.05

15 gram

Deriye sürülerek kullanılır.

Etkin madde: Betametazon dipropionat

Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, karboksipolimetilen, sodyum hidroksit, propilen glikol, saf su

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **DIPROLENE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DIPROLENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DIPROLENE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DIPROLENE'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. DIPROLENE nedir ve ne için kullanılır?

DIPROLENE yabancı madde içermeyen beyaz bir pomat olup, 15 gramlık alüminyum tüplerde ambalajlanmıştır.

DIPROLENE, deri hastalıklarında kullanılan, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır ve bu tip ilaçların güçlü olanlar grubunda yer alır.

DIPROLENE, sedef hastalığına ve kortizon-tipi ilaçlara yanıt veren diğer deri hastalıklarına eşlik eden iltihabın, kaşıntının ve rahatsızlığın giderilmesinde yardımcı olarak kullanılabilir.

2. **DIPROLENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

DIPROLENE'ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Beklometazon dipropionata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine ya da diğer kortizon-tipi ilaçlara karşı duyarlı (alerjik) iseniz
- Derinizde suçiçeği, uçuk gibi viral enfeksiyonlar varsa
- Derinizde mantar enfeksiyonu varsa
- Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı), akne, ağız etrafında dermatit, genital bölgede kaşıntı, pişik, zona veya diğer cilt enfeksiyonları varsa

DIPROLENE 'ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Çocuklarda
- Bebeğinizi emziriyorsanız
- Hamile iseniz
-

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız"

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın hamilelik sırasında kullanımıyla ilişkili bilgi yoktur. Eğer doktorunuz öneriyorsa; DIPROLENE 'ni büyük miktarlarda ve uzun süreli kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu tip topikal ilaçlar deriden emilerek kana karışabildiklerinden, ağızdan veya enjeksiyonla kullanılan steroidlerin etkilerini güçlendirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı (deri hastalıklarında kullanılanlar dahil) şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. **DIPROLENE nasıl kullanılır?**

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde iki kez sabah ve akşam veya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Tedavi süresi, alınan yanıtı göre birkaç günle daha uzun süreler arasında değişebilir ama hastalık tekrar

değerlendirilmeden, 4 haftayı aşmamalıdır. İyileşme sağlandığında DIPROLENE Pomat kullanımına son veriniz.

DIPROLENE'ni yüzünüze 5 günden fazla uygulamayınız.

DIPROLENE çocuklarda kullanılırken, vücudun herhangi bir bölgesine 5 günden daha uzun süre uygulanmamalıdır.

DIPROLENE 'ni gözüne temas ettirmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

DIPROLENE hasta bölgeyi tamamen kaplayacak ince bir tabaka halinde sürülerek kullanınız ve ovuşturularak deriye yediriniz. Her kullanım sonrasında ellerinizi sabunla iyice yıkayınız. Doktorunuz önermediği sürece, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız.

“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: Doktorunuz önermiyorsa 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Eğer DIPROLENE'nin etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DIPROLENE kullandıysanız:

Bu ilacı kazara yutacak olursanız, derhal tıbbi yardım arayın.

Eğer DIPROLENE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DIPROLENE kullanmayı unutursanız:

DIPROLENE kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DIPROLENE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Çok yaygın : Deride yanma ve iğnelenme hissi, deride kuruluk, kaşıntı, tahriş

Seyrek: Deride karıncalanma, iğnelenme hissi, deride gerilme veya çatlama, sıcaklık hissi, tabaka halinde ve lezyon çevresinde pullanma, döküntü, deride incelme, kızarıklık, deride ince damarlanmalar

Çok seyrek: Deride kaşıntı, kıl dibi iltihabı, kıllanmada artma, sivilce benzeri oluşumlar, deri renginde azalma, ağız çevresinde iltihap, temasla ortaya çıkan deri iltihabı, derinin yumuşaması, infeksiyon gelişimi, deride çatlaklar, terlemeye bağlı döküntüler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Bu ilacı kullanan çocuklar ve ergenler, ilacın deriden emilebilmesi ve büyümeyi etkileyebilmesi ya da istenmeyen başka etkilere yol açabilmesi nedeniyle, doktorları tarafından yakından izlenmelidir.

5. DIPROLENE'nin saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C' nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutunun ve tüpün üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DIPROLENE Pomat'ı kullanmayınız.

"Eğer ambalajın hasar gördüğünü farkederseniz DIPROLENE Pomat'ı kullanmayınız".

Ruhsat sahibi:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı .../... tarihinde onaylanmıştır.