

## KULLANMA TALİMATI

### İNDEXPA SR 75/300 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 75 mg deksketoprofen'e eşdeğer 110,64 mg deksketoprofen trometamol ve 300 mg parasetamol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz, starch RX 1500, PVPK-30, magnezyum stearat, HPMC 4000 SR, laktoz anhidrus DC, kolloidal silikon dioksit, opadry II 85G18490 white [titanyum dioksit (E171), talk, makrogol/peg 3350, lesitin (soya) (E322)] içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **İNDEXPA SR nedir ve ne için kullanılır?**
2. **İNDEXPA SR'ı kullanmadan önce dikkat etmeniz gerekenler.**
3. **İNDEXPA SR nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **İNDEXPA SR'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. İNDEXPA SR nedir ve ne için kullanılır?**

İNDEXPA SR 75/300 mg film kaplı tablet etkin madde olarak deksketoprofen trometamol ve parasetamol içerir.

Deksketoprofen trometamol, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Parasetamol ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

İNDEXPA SR, eklem kireçlenmesinin (osteoartrit), orta şiddette veya şiddetli eklem ağrıları ve şekil bozukluğunun (romatoid artrit), sırt kemiklerinde sertleşme ile seyreden ağrılı romatizmal hastalıkların (ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut (damla hastalığı) artrit (eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrıları ve adet ağrıların tedavisinde kullanılır.

İNDEXPA SR, 10 ve 20 SR film kaplı tablet PVC/ PVDC/ Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulur.

## **2. İNDEXPA SR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **İNDEXPA SR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Deksketoprofen trometamole, parasetamole ya da İNDEXPA SR'ın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
- Asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
- Bronşiyal astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,
- Peptik ülser, mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlarınız varsa (örn. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden geçirdiyse;
- Ağrı kesici olarak kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyse,
- Süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa,
- Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
- Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim (G6PD) eksikliği hastalığınız varsa,

- Ciddi kalp yetmezliđiniz varsa,
- Bbrek yetmezliđiniz varsa,
- Karaciđer yetmezliđiniz varsa,
- Kanama bozukluđunuz veya kan pıhtılařma bozukluđunuz varsa,
- Hamileliđinizin uęnc uę aylık dnemindeyseniz veya emziriyorsanız.
- Koroner arter bypass greft ameliyatı sz konusu ise ve ameliyat sırasında ađrı tedavisi almanız gerekiyorsa.

### **İNDEXPA SR'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer;

- Alerjiniz varsa veya geęmiřte alerjik sorunlarınız olduysa,
- Diretik (idrara sktrc) ilaęlar alıyorsanız veya ařırı sıvı kaybı nedeniyle (rn. ařırı idrara ıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliđi ve kan hacminde azalma sorunları yařıyorsanız;
- reme problemi olan bir kadın iseniz (İNDEXPA SR remeyi olumsuz ynde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptırıcaksanız bu ilacı kullanmayınız),
- Hamileliđinizin birinci veya ikinci uę aylık dnemindeyseniz,
- Kan veya kan hcreleri yapımı bozukluđunuz varsa,
- Sistemik lupus eritomatozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gsteren bir hastalık) veya karıřık bađ dokusu hastalıđınız varsa (bađ dokusunu etkileyebilen bađıřıklık sistemi bozuklukları),
- Geęmiřte uzun sreli iltihaplı bađırsak hastalıđı geęirdiyseniz (lseratif kolit, Crohn hastalıđı),
- 18 yařın altındaysanız.
- Tedaviniz boyunca ařađıdakilerden herhangi birini yařarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dıřkıdan kan gelmesi, siyah renkte katranımsı dıřkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte paralar gelmesi,
- Hazımsızlık veya gđste yanma hissi, karın ađrısı veya diđer anormal karın belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danıřınız.
- Akciđer hastalıđınız varsa,
- řeker hastalıđınız varsa,
- Ađrı kesiciler de dahil olmak zere bařka ilaęlar kullanıyorsanız,

- Gilbert Sendromu adı verilen bir rahatsızlığınız var ise,
- 3-5 gündür bu ilacı kullanmanıza rağmen yeni şikayetlerinizin olması veya ağrının azalmaması durumunda,
- Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa (daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir),
- Kan basıncınız yüksek ise (hipertansiyon) (İNDEXPA SR tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir),
- Yaşlıysanız,
- Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa,
- Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa,
- İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
- Sıvı tutulması veya ödem olursa,
- İNDEXPA SR ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonları görülebilir. Bu tür reaksiyonlar meydana geldiği takdirde derhal doktorunuza haber veriniz.
- Astımınız varsa, dikkatli kullanınız.
- Kansızlık (anemi) ,
- Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda İNDEXPA SR kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir.
- Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **İNDEXPA SR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

İNDEXPA SR'ı yeterli miktarda su ile alınız.

İNDEXPA SR'ı yiyecek ile almanız mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, akut ağrınız varsa, tabletleri aç karnına alınız.

İNDEXPA SR'ı yemeklerden en az 30 dakika önce almanız, İNDEXPA SR'ın biraz daha hızlı etki göstermesine yardımcı olur.

İNDEXPA SR'ın içeriğindeki parasetamol, alkol veya alkol içeren yiyecek/içecek vb. (örn. bazı ilaçlar) ile birlikte alındığında karaciğerinize zarar verebilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca İNDEXPA SR kullanmayınız. Çok gerekli olmadıkça İNDEXPA SR'ı hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi süresince kullanmamak en iyi seçim olacaktır. Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız İNDEXPA SR kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

İNDEXPA SR emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

İNDEXPA SR, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi, uyuklama, görme bozuklukları veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

### **İNDEXPA SR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İNDEXPA SR 41,86 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

İNDEXPA SR 0,525 mg soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

İNDEXPA SR'ın yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

- Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: Propantel vb.),
- Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: Metoklopramid gibi),

- Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
- Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
- Diğer ağrı kesici ilaçlar.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

- Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar,
- Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar,
- Bazı duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum,
- Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat,
- Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin,
- Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazol.

Önlem gerektiren kombinasyonlar:

- Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ACE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri,
- Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin,
- Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin,
- Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid.

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

- Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siproflaksasin, levofloksasin),
- Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus,
- Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar,
- Gut tedavisinde kullanılan probenesid,
- Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin,
- Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston,
- Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI'ler),

- Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. İNDEXPA SR nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

İNDEXPA SR'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz günde 1 kez 1 İNDEXPA SR 75/300 mg film kaplı tablettir.

Doktorunuz İNDEXPA SR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Deksketoprofenin toplam günlük dozu 75 mg'ı, parasetamolün toplam günlük dozu ise 4 g'ı geçmemelidir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Tabletler bir bardak (150 ml) su ile yutulmalıdır.

Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, tableti, emilimi daha kolay olacağından aç karnına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız (bkz. Bölüm 2. "İNDEXPA SR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması").

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

18 yaş altındaki çocuklarda İNDEXPA SR kullanımı önerilmemektedir.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

İNDEXPA SR'ın yaşlı hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

#### **Özel kullanım durumları**

##### **Böbrek yetmezliği:**

İNDEXPA SR böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

##### **Karaciğer yetmezliği:**

İNDEXPA SR karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

*Eğer İNDEXPA SR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla İNDEXPA SR kullandıysanız:**

Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma İNDEXPA SR'ın aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

*İNDEXPA SR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **İNDEXPA SR'ı kullanmayı unutursanız:**

Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, İNDEXPA SR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, İNDEXPA SR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlar,
- Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anaflaktik şok),
- Deride içi sıvı dolu kabarcıklar (toksik epidermal nekroliz),
- Deride döküntü,
- Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma, bronkospazm),
- Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma),



- Kan pulcuęu sayısında azalma (halsizlik, solukluk, yorgunluk),
- Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara -iltihap oluřturan mikrobik hastalık-yakalanma),
- Kan hücrelerinde azalma (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, sık enfeksiyonlara -iltihap oluřturan mikrobik hastalık-yakalanma),
- Ateř, ięne bařı řeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, bař ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüęü trombositopenik purpura (kan pulcuęu sayısında azalma ile iliřkili deri bulguları),
- Karacięer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sarılık, yüzde lekeler),
- Cilt, aęız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),
- Nefes darlığı,
- Hızlı kalp atıřı,
- Düşük kan basıncı,
- Yüksek kan basıncı,
- Pankreasta iltihaplanma,
- Karacięer hücresi hasarı (hepatit),
- Peptik ülser,
- Bayılma,
- Çok yavař nefes alıp verme,
- Prostat sorunları,
- Anormal karacięer fonksiyonu testleri (kan testleri).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

**Ařaęıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Mide bulantısı, mide rahatsızlıkları,
- Kusma,
- İřhal,
- Bař dönmesi (vertigo),
- Uyku hali,

- El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme),
- Karın ağrısı,
- Sindirim sorunları (hazımsızlık),
- Sersemlik,
- Uyku düzensizlikleri,
- Sinirlilik,
- Baş ağrısı,
- Çarpıntı,
- Kızarma,
- Kabızlık,
- Ağız kuruluğu,
- Şişkinlik,
- Deri döküntüsü,
- Yorgunluk,
- Ağrı,
- Ateş ve titreme hissi,
- Genel kırıklık, keyifsizlik hissi,
- Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi),
- İştah kaybı (anoreksi),
- Duyularda anormallik,
- Kaşıntılı döküntü,
- Akne,
- Terleme artışı,
- Sırt ağrısı,
- Adet düzensizlikleri,
- Bulanık görme,
- Kulaklarda çınlama (tinnitus),
- Deride hassasiyet,
- Işığa karşı duyarlılık,
- Kaşınma.

Bunlar İNDEXPA SR'ın hafif yan etkileridir

Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi farkederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama),

Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez İNDEXPA SR kullanımını bırakınız.

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

İNDEXPA SR gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### 5. İNDEXPA SR'ın Saklanması

*İNDEXPA SR'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İNDEXPA SR'ı kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz İNDEXPA SR'ı kullanmayınız.

**Ruhsat sahibi :** Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.  
Yıldız Teknik Üniversitesi  
Davutpaşa Kampüsü  
Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3  
Esenler/İSTANBUL  
Tel: 0850 201 23 23  
Fax: 0212 482 24 78  
E-posta: info@vitalisilac.com.tr

**Üretim Yeri:** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 22.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.*