

KULLANMA TALİMATI

KAF 22.5mg/5ml FORT şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup 22.5 mg butamirat sitrat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sorbitol %70 non-kristalin, propilen glikol, gliserin, sukraloz, sodyum benzoat, masking flavour, portakal aroması, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***KAF 22.5mg/5ml FORT nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***KAF 22.5mg/5ml FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***KAF 22.5mg/5ml FORT nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***KAF 22.5mg/5ml FORT'un saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. KAF 22.5mg/5ml FORT nedir ve ne için kullanılır?

- KAF 22.5mg/5ml FORT etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- KAF 22.5mg/5ml FORT, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- KAF 22.5mg/5ml FORT, çocuk emniyetli HDPE kapaklı, amber renkli ölçü çizgili 60 ml ve 100 ml'lik cam şişelerde ölçekle birlikte kullanıma sunulmaktadır.
- KAF 22.5mg/5ml FORT çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2. KAF 22.5mg/5ml FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KAF 22.5mg/5ml FORT'u ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eđer sizin/çocuđunuzun butamirat veya NOTUSS FORT'un bileřiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karřı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa

Eđer çocuđunuz 3 yařın altında ise KAF 22.5mg/5ml FORT'u kullanmayınız.

KAF 22.5mg/5ml FORT'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer siz/çocuđunuz aynı zamanda bařka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. KAF 22.5mg/5ml FORT'un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

KAF 22.5mg/5ml FORT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyecek ve ieceklerle etkileřimi bildirilmemiřtir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay KAF 22.5mg/5ml FORT kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduđuna karar verirse KAF 22.5mg/5ml FORT kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Bebeđinizi emziriyorsanız, KAF 22.5mg/5ml FORT almadan önce doktorunuza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

KAF 22.5mg/5ml FORT uyukulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle ara ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diđer iřleri yaparken dikkatli olunuz.

KAF 22.5mg/5ml FORT'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KAF 22.5mg/5ml FORT sorbitol iermektedir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıđınız olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

KAF 22.5mg/5ml FORT, 5 ml'lik dozunda 10 g'dan daha az gliserin ierir. Gliserin'e karřı herhangi bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her 5 ml'sinde 17.50 mg sodyum sitrat dihidrat ve 5.00 mg sodyum benzoat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

İçeriğinde propilen glükol bulunmaktadır ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KAF 22.5mg/5ml FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 2 defa 5 ml

12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 5 ml

Yetişkinlerde : Günde 4 defa 5 ml

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, KAF 22.5mg/5ml FORT'u 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

KAF 22.5mg/5ml FORT ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için ölçeği kullanınız. Ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulaştırınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

KAF 22.5mg/5ml FORT'un 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

KAF 22.5mg/5ml FORT'un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

KAF 22.5mg/5ml FORT, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer KAF 22.5mg/5ml FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KAF 22.5mg/5ml FORT kullandıysanız:

KAF 22.5mg/5ml FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KAF 22.5mg/5ml FORT'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda KAF 22.5mg/5ml FORT alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

KAF 22.5mg/5ml FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KAF 22.5mg/5ml FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KAF 22.5mg/5ml FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KAF 22.5mg/5ml FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Uyku hali
- Bulantı
- İshal

Bunlar KAF 22.5mg/5ml FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. KAF 22.5mg/5ml FORT'un saklanması

KAF 22.5mg/5ml FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KAF 22.5mg/5ml FORT'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *KAF 22.5mg/5ml FORT'u* kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4
34467 Maslak – Sarıyer / İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 286 10 37

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3
Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.