

## KULLANMA TALİMATI

### NIASPAN® 375 mg uzatılmış salımlı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir uzatılmış salımlı tablet 375 mg nikotinik asit içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Hipromelloz, Povidon, Stearik asit.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **NIASPAN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NIASPAN®'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NIASPAN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NIASPAN®'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. NIASPAN® nedir ve ne için kullanılır?**

- Her bir NIASPAN® 375 mg Uzatılmış Salımlı Tablet, 375 mg nikotinik asit içerir. 7 ve 14 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
- NIASPAN®, beyaz-beyaza yakın renkli kapsül şekilli tablettir. Her bir tabletin bir yüzünde tablet kuvveti basılıdır.
- NIASPAN®, nikotinik asit içerir. NIASPAN® tabletleri nikotinik asidi yavaşça serbest bırakır.



- Kanınızdaki yağların (lipidlerin) seviyeleri, kalbinizin ve kan damarlarınızın sağlıklı bir şekilde korunması için önemlidir.
- Kolesterol kanınızdaki yağlardan biridir ve iki tipi bulunmaktadır;
  - **‘Kötü’ kolesterol veya LDL** (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein) kolesterol. Bu ‘kötü’ kolesterol olarak tanımlanmaktadır çünkü kalbiniz ile vücudunuzun geri kalanı arasındaki kan damarlarında (arterler) birikebilir. Bu yağlı birikim plak olarak tanımlanır ve muhtemelen kalp krizi veya inme (felç) geçirmenize neden olur.
  - **‘İyi’ kolesterol veya HDL** (Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein) kolesterol. Bu ‘iyi’ kolesterol olarak tanımlanır çünkü arterlerde birikmez.

NIASPAN®, kanınızda ‘iyi’ kolesterol miktarını arttırarak ve ‘kötü’ kolesterol miktarını azaltarak çalışır.

NIASPAN®, genellikle ‘statin’ olarak tanımlanan bir ilaç ile beraber alınır. Bu kanınızdaki yağları (lipidleri) azaltan başka bir ilaçtır. Statinler sizin için uygun değilse, doktorunuz size NIASPAN®’ı tek başına reçeteleyebilir. Eğer ayrıca statin alıyorsanız, lütfen o statinin kullanma talimatını okuyunuz.

NIASPAN®, sağlıklı bir yaşam şeklinin yararlarının yerine geçemez. Dengeli, az yağlı diyeti korumaya ve düzenli egzersiz yapmaya çalışınız.

## 2. NIASPAN®’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### NIASPAN®’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Nikotinik aside veya NIASPAN®’ın diğer içeriklerinden herhangi birine allerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise,
- Karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmasını durduran bir karaciğer probleminiz var ise,
- Mide veya barsakta (ince barsak) ülseriniz var ise,
- Atardamar kanamanız (Kalbiniz ve vücudunuzun geri kalanı arasındaki bir kan damarından ciddi kanama) var ise,

### NIASPAN®’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Doktorunuza söyleyiniz:

Eğer;

- Şimdiye kadar karaciğer problemlerinizi olduysa (gözlerinizin veya derinizin sarı olmasına (sarılık) veya hasta, yorgun hissetmenize, normaldekenden daha koyu idrarınız olmasına, yüksek sıcaklığa (ateş) veya genel olarak iyi hissetmemenize neden olabilen karaciğer problemleri)

Bir statin ilacı ile beraber NIASPAN® almadan önce, eğer aşağıdakilerden biri sizin için geçerliyse doktorunuza bildiriniz:

- böbrek problemleri
- normalin altında çalışan tiroid bezi (hipotiroidizm)
- 70 yaş üzeri

- sizin veya ailenizin kas problemlerinin olması (aileden geçen kas problemleri)
- çok fazla alkol içilmesi
- geçmişte kan yağlarını (lipidler) azaltan ilaçlar ile kas problemlerinin olması

NIASPAN® ve bir ‘statin’i beraber almak, muhtemelen kas hasarınızın (miyopati veya rabdomiyoliz) olmasına neden olur. Yukarıdaki durumlardan herhangi birinin sizde olması bu riski arttırabilir. NIASPAN® ile beraber statin kullanıp kullanamayacağınızı görmek için doktorunuzun bir kan testi yapması gerekebilir.

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa doktorunuza söyleyiniz:

- diyabet: Kan şekerinizi (glukoz) daha sık kontrol ettirmeniz gerekebilir, çünkü NIASPAN® kan şeker seviyenizi arttırabilir. Diyetinizi, insülin veya diyabet ilaçlarınızı değiştirmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuzla konuşmanız gerekebilir. İdrarınızdaki glukozun ölçümü için yapılan testin uygun olup olmadığını doktorunuz ile kontrol ediniz. Çünkü NIASPAN® bazı testlerde yanlış sonuçlara neden olabilir (Benedict reaktifi olarak tanımlanır).
- göğüs ağrısı (stabil olmayan anjin) veya yakın bir zamanda geçirilen kalp krizi: Özellikle kan basıncını azaltan ilaçlar da alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’ bölümüne bakınız).
- gut veya daha önce bir gut hastalığınız olduysa: Kanınızdaki ürik asit seviyesinin kontrol edilmesi gerekebilir.
- kanınızdaki düşük fosfor seviyesi riski: NIASPAN® fosfor seviyesini azaltabileceğinden doktorunuz kanınızı kontrol etmek isteyebilir.
- Mide veya barsakta ülser, sarılık, karaciğer veya safra kesesi hastalığınız olduysa.

Eğer ameliyat olmayı planlıyorsanız, doktorunuza NIASPAN® aldığınızı söyleyiniz. NIASPAN® kanınızın pıhtılaşmasını etkileyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

### **NIASPAN®’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

NIASPAN®’ı aldığınız zamana yakın bir zamanda alkol veya sıcak içecekler içmemeniz önerilir. Çünkü bunlar ciltte yaygın kızarıklık ve kaşıntı gibi yan etkileri arttırabilir. NIASPAN® alırken herhangi bir zamanda ağır bir şekilde alkollü içki içmek karaciğer veya kas hasarı riskini arttırabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız NIASPAN® almadan önce doktorunuz ile konuşun. NIASPAN®’ın bebeğe zarar verip veremeyeceği bilinmemektedir. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emziriyorsanız NIASPAN® almayınız. Çünkü ilaç süte geçebilir.

### **Araç ve makine kullanımı**

NIASPAN®'ın araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi muhtemel değildir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, bu durum özellikle önemlidir:

- diyabet ilaçları (insülin dahil): Kan şekerinizi (glukoz) daha sık kontrol ettirmeniz gerekebilir. Ayrıca diyetinizi veya diyabet ilacınızın dozunu değiştirmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuz ile konuşmanız gerekebilir.
- kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar (antikoagülanlar): Daha sık kan testi yaptırmanız gerekebilir.
- reçine olarak tanımlanan ilaçlar (safra asidi bağlayıcıları): Bunları gün içinde NIASPAN®'dan farklı bir zamanda alınız. Çünkü reçineler, NIASPAN® ile beraber alındıklarında NIASPAN®'ın çalışmasını durdurabilirler. Ayrıca reçine ilacının kullanma talimatına da bakınız.
- kan basıncını düşürebilen ilaçlar (nikotin bantları, nitratlar, kalsiyum kanal blokörü veya beta-blokör gibi): NIASPAN® kan basıncını daha fazla düşürebilir.
- statinler (kanınızdaki kolesterolü düşüren ilaçlar): Bu ilaçlar NIASPAN® ile birlikte alınır, muhtemelen hasarlı kaslarınız olabilir. Ayrıca statin ilacının kullanma talimatına da bakınız.
- yüksek dozda niacin veya nikotinamid (nikotinik asit yıkılması sonucu ortaya çıkan maddeler) gibi benzer bileşikler içeren vitaminler veya diğer beslenme destekleri NIASPAN®'ın yan etkilerini arttırabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. NIASPAN® nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz sizi düşük doz NIASPAN® ile başlatacaktır ve ilacın sizi etkileme durumuna bağlı olarak yavaş yavaş dozunu arttıracaktır. Önerilen başlangıç tedavisi 3 hafta sürer:

- İlk hafta: yatmadan önce bir adet 375 mg tablet
- İkinci hafta: yatmadan önce bir adet 500 mg tablet
- Üçüncü hafta: yatmadan önce bir adet 750 mg tablet

Bu başlangıç döneminden sonra, doz genellikle sonraki 4 hafta için yatmadan önce iki adet 500 mg tablet (1000 mg) şeklindedir. Bu dönemden sonra doktorunuz sizin için en uygun dozun ne olduğuna karar verebilir. Günlük maksimum miktar 2000 mg'dır.

Günlük dozu oluşturmak için önerilenler dışında diğer dozaj formlarının tabletlerini biraraya getirmeyiniz. Buna ek olarak, NIASPAN® diğer nikotinik asit preparatlarından farklıdır, bundan dolayı NIASPAN®'ı diğer ilaçlarla değiştirmeyiniz.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

- NIASPAN®'ı yatmadan önce alınız.
- Az yağlı küçük bir öğünden sonra alınız (örn. bir elma, az yağlı yoğurt veya bir dilim ekmek).
- NIASPAN®'ı yutmadan önce kırmayınız, ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.
- Her bir tableti bütün olarak biraz sıvı ile yutunuz.

### **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** NIASPAN® tabletleri sadece yetişkinler içindir. Çocuklar veya adolesanlar için önerilmemektedir.

**Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlı insanların genellikle genç insanlarla aynı miktara ihtiyacı vardır.

### **Özel kullanım durumları:**

**Karaciğer ve böbrek yetmezliği:** Böbrek veya karaciğer problemlerinizi varsa doz ile ilgili ilave öneri için doktorunuza danışınız.

**Cinsiyet:** Kadınların erkeklere göre daha az miktarda NIASPAN®'a ihtiyacı olabilir.

*Eğer NIASPAN®'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla NIASPAN® kullandıysanız:**

Hemen doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

*NIASPAN®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **NIASPAN® kullanmayı unutursanız:**

Unutulan dozu yerine koymak için çift doz almayınız. Bir sonraki akşam her zamanki dozunuzu alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **NIASPAN® ile tedaviye tekrar başlanması:**

NIASPAN®'ı bir süre almadıysanız ve tekrar başlamak istiyorsanız, doğru başlangıç dozu için lütfen doktorunuza danışınız.

### **Başka bir nikotinik asit preparatından NIASPAN®'a geçiş:**

Başka bir nikotinik asit preparatından NIASPAN®'a geçmek istiyorsanız, düşük bir doz ile başlamalısınız. Lütfen tavsiye için doktorunuza danışınız.

### **Kan veya idrar testleri:**

Tedaviniz sırasında doktorunuz zaman zaman kan testi yapacaktır. Bu karaciğerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek içindir.

‘Katekolaminler’ olarak tanımlanan hormonlar için test yaptırırsanız, kan veya idrarınızı alan kişiye NIASPAN® aldığınızı söyleyiniz.

NIASPAN®’in kullanılması ile ilgili daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, NIASPAN®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tüm ilaçlar gibi NIASPAN® herkeste görülme bile yan etkilere neden olabilir. Genellikle yan etkiler erkeklere göre kadınlarda daha sık meydana gelir.

**Aşağıdakilerden biri olursa NIASPAN® kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

#### **- Allerjik reaksiyonlar**

Allerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlar çok seyrek (10.000’de 1 kişiden daha azını etkiler).

Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

- al basması, ciltte döküntü, ürtiker (kurdeşen), su dolu kabarcıklı döküntü
- nefes alıp vermekte zorluk ile beraber boğazda veya yüzde şişme (anjioödem, larengospazm)
- nefes darlığı
- kan basıncında düşme veya kolaps.

**Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

#### **- Al basması (ciltte yaygın kızarıklık)**

Al basması çok yaygın bir yan etkidir (10’da 1 kişiden fazlasını etkiler). Genellikle NIASPAN® almaya başladıktan veya doz yükseltildikten hemen sonra meydana gelir.

- Al basması; sıcaklık hissi, kızarıklık, kaşıntı veya karıncalanmayı kapsar. Bu genellikle yüzde, boyunda, göğüste ve sırtta meydana gelir.
- Birçok kişi için birkaç haftalık NIASPAN® kullanımı sonrası al basması daha az sıklıkta meydana gelir ve daha az hissedilirdir. Tamamen durabilir.
- Seyrek vakalarda, al basması daha şiddetli olabilir ve baş dönmesi hissedebilirsiniz, çok hızlı alışılmadık güçlü kalp atışınız olabilir, nefes darlığı, terleme, üşüme hissi, şişme (ödem) ve baygınlık olabilir.

### **Diğer yan etkiler:**

Yaygın (10’da 1 kişiden daha azını etkiler)

- diyare
- hasta hissetme veya hasta olma
- karın ağrısı veya hazımsızlık
- kaşınma veya döküntü

Yaygın olmayan (100'de 1 kişiden daha azını etkiler)

- terleme, sersemlik hissi, nefes darlığı
- baş ağrısı
- çok hızlı veya alışılmadık güçlü kalp atışı
- genel döküntü, kurdeşen veya cilt kuruluğu
- ağrı veya kol ve bacaklarda şişme (periferel ödem)
- kuvvetsiz hissetme veya üşüme hissi
- kan testi sonuçlarınızda değişiklikler (vücudunuzun çalışma şeklinin etkilendiğini gösteren kan testi sonuçları) (örn. karaciğer veya kas fonksiyonu, kan pıhtılaşması).

Seyrek (1000'de 1 kişiden daha azını etkiler)

- kaşınma, akıntılı burun (rinit)
- kan şekerinizde problem (azalmış glukoz toleransı)
- uyku problemleri, sinirli hissetme
- kan basıncında düşüş veya baygınlık (özellikle ayağa kalkarken)
- karıncalanma hissi (parestezi)
- görme problemleri
- yüzde şişme
- su dolu kabarcıklı döküntü, deriden hafif kabarık döküntü
- bacak krampları, ağrı veya kuvvetsizlik gibi kas problemleri
- göğüs ağrısı
- gaza bağlı mide barsakta şişkinlik (flatulans) veya geğirme (erüktasyon)

Çok seyrek (10000'de 1 kişiden daha azını etkiler)

- aşırı iştahsızlık (anoreksi)
- damla hastalığı (gut)
- migren
- belirli göz problemleri (toksik ambliyopi (görme keskinliğinin azalması), kistöz maküler ödem (gözün arka tarafında kiste benzer şişme))
- belirli kalp problemleri (kalpte bir çeşit atım bozukluğu, diğer kalp ritim bozuklukları)
- belirli mide veya barsak problemleri (ülserler)
- sarı cilt ve göz rengi (sarılık), ciltte koyulaşma (hiperpigmentasyon) veya koyulaşmış cilt lekeleri (akantozis nigrikans)

Eğer kaslarınızda ağrı, hassasiyet veya kuvvetsizlik hissediyorsanız ve özellikle de statin alıyorsanız derhal bir doktora söyleyiniz.

Eğer yan etkilerden herhangi biri şiddetlenirse, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. NIASPAN®'in saklanması**

*NIASPAN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

NIASPAN®'i 25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NIASPAN®'i kullanmayınız.*

Nemden korumak için orijinal ambalajı içinde saklayınız.

*Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız NIASPAN®'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız.  
Bu konuda eczacınıza danışınız.*

**Ruhsat sahibi:** ABBOTT Laboratuvarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.  
Kavacık Mah. Ekinciler Cad.  
Muhtar Sk. No.3  
Beykoz/İstanbul

**Üretici:** Kos Pharmaceuticals, Inc.  
18 Mayfield Avenue, Edison,  
New Jersey ABD

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*