

KULLANMA TALİMATI

EX-LOVIR % 1 Krem

Haricen cilde uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 g krem 10 mg pensiklovir içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Propilen glikol, sıvı parafin, Polisorbitat 80, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **EX-LOVIR nedir ve ne için kullanılır?**
 2. **EX-LOVIR'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
 3. **EX-LOVIR nasıl kullanılır?**
 4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
 5. **EX-LOVIR'in saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

1. EX-LOVIR nedir ve ne için kullanılır?

- EX-LOVIR etkin madde olarak pensiklovir içeren "krem" formunda bir ilaçtır. EX-LOVIR krem, beyaz renkli, pürüzsüz görünümündedir.
- EX-LOVIR, topikal antiviral ajanlar adı verilen ve virüslerin çoğalmasını engelleyen ilaçları içeren bir gruba dahildir.
- EX-LOVIR krem, 2 g'lık tüpler içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır.
- EX-LOVIR uçuk (Herpes labialis) tedavisinde kullanılır. Bu virüs uzun süreli inaktiftir ; ancak tetiklendiğinde çoğalır ve uçuk gelişir. Tetiklenme soğuk algınlığı, grip yada güçlü güneş ışığına maruziyetle meydana gelebilir. Virüs dudaklarda içi su dolu ağrılı kabarcıklara

neden olabilir. EX-LOVIR uçuğunuzun daha kısa sürede iyileşmesini ve ağrınızın daha kısa sürede hafiflemesini sağlar.

- EX-LOVIR virüslerin çoğalmasını durdurarak uçuğunuzun bulaşıcılığının daha kısa sürede sonlanmasını sağlar ancak yine de uçuğunuzun başka kişilere bulaşmasını tamamen engellemez.

2. EX-LOVIR'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EX-LOVIR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Pensiklovir, famsiklovir veya EX-LOVIR'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

EX-LOVIR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer :

- Yaranızın uçuk olduğundan emin değilseniz
- İnfeksiyonlarla savaşan bağışıklık sisteminizi zayıflatan bir tedavi alıyorsanız veya HIV enfeksiyonu (AIDS), kemik iliği nakli veya kanser tedavisi gibi durumlar varsa EX-LOVIR'i dikkatli kullanınız.
- Kremi sadece dudaklarınızın üzerinde ve ağzınızın etrafındaki uçuk yaralarında kullanınız. Dudakların içine, burna veya genital bölgeye uygulamayınız. Göz ve göz çevresine uygulamayınız.

Uçuğunuz olduğunda almanız gereken genel önlemler:

Uçuğun bir enfeksiyon bölgesi olduğunu unutmayınız.

Virüsün vücudunuzun diğer bölgelerine veya diğer insanlara bulaşmaması için uçuğunuz varsa aşağıdaki durumlarda dikkatli olunuz:

- Özellikle çocuklarla öpüşmekten kaçınınız.
- Oral seks yapmaktan kaçınınız.
- Yalnız kendi havlunuzu kullanınız ve çatal, bıçak, bardak, tabak gibi eşyaları başkalarıyla paylaşmayınız.
- İyileşme süresini uzatacağından kabarcıkları patlatmayınız.
- Gözlerinize dokunmaktan kaçınınız–virüs gözlere yerleştiğinde çok ciddi sorunlara neden olabilir.
- Belirtileri sizinkilerle aynı bile olsa bu kremi başkalarına vermeyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Hamile iseniz, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse EX-LOVIR kullanabilirsiniz.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Bebeğinizi emziriyorsanız, doktorunuz gerekli görmedikçe EX-LOVIR kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

- EX-LOVIR'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

EX-LOVIR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EX-LOVIR krem, propilen glikol içermektedir.

- Propilen glikol ciltte tahrişe (iritasyon) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EX-LOVIR'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EX-LOVIR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar:

EX-LOVIR'i, gün içinde yaklaşık iki saatlik aralıklarla (günde yaklaşık 8 defa) uygulayınız.

Tedaviye 4 gün devam ediniz. Belirtiler geçmez veya kötüleşirse ya da 4 günlük tedavinin sonunda uçüğunuzda iyileşme olmazsa doktorunuza danışınız.

Tedaviye uçüğün ilk belirtisinden itibaren mümkün olduğu kadar erken başlayınız. Ancak

EX-LOVIR'i kabarcık oluştuktan sonra da kullanabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

EX-LOVIR haricen uygulanır.

EX-LOVIR'i uygulamadan önce ve uyguladıktan sonra her zaman ellerinizi yıkayınız.

Küçük bir miktarı parmağınıza sıkınız ve etkilenen bölgeye uygulayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

EX-LOVIR'in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

EX-LOVIR, yaşlılarda yetişkinler için önerilen dozda kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

EX-LOVIR böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer EX-LOVIR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EX-LOVIR kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla EX-LOVIR kullandıysanız, cildinizde iritasyon oluşması dışında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

EX-LOVIR kaza ile yutulduğunda herhangi bir zararlı etkisi yoktur ve tedavi gerekli değildir ama ağızda iritasyona neden olabilir. Herhangi bir şüpheniz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

EX-LOVIR'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

EX-LOVIR'i kullanmayı unutursanız:

Eğer EX-LOVIR'in bir dozunu uygulamayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu uygulayınız ve tedavinize daha önceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

EX-LOVIR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında uçuğunuzun iyileşme süresinin uzaması dışında bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, EX-LOVIR'in bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

EX-LOVIR genellikle iyi tolere edilmektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa EX-LOVIR'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte iltihaplanmalar
- Ciltte kızarıklık, döküntü
- Kaşıntı
- Ödem

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EX-LOVIR'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Geçici yanma
- Batma
- Uyuşma

Bunlar EX-LOVIR'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. EX-LOVIR'in saklanması

EX-LOVIR'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Dondurmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EX-LOVIR' i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EX-LOVIR'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

TRIOZER İlaç Kim. Koz. Saę. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Őti.

Cevizli Mah. Orhangazi Cad. Tınaztepe Sok. No:4 Daire 2 Maltepe /İSTANBUL

Üretim yeri:

Merkez Laboratuvarı İlaç San. ve Tic. A.Ő.

Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sokak No: 6

Taşdelen – Çekmeköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 04 /11/ 2011 tarihinde onaylanmıŐtır.