

## KULLANMA TALİMATI

### ETOVER 100 mg/ml Sprey

Deri üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:**50 ml sprey solüsyonu 5 g etofenamat içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Makragol 400, propilen glikol, sitrik asit çözeltisi, izopropil alkol.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ETOVER nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ETOVER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ETOVER nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ETOVER 'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ETOVER nedir ve ne için kullanılır?**

ETOVER, kutuda, püskürtme adaptörü bulunan 50 ml çözelti içeren renkli cam şişede sunulur. Açık sarı renkte, hemen hemen berrak çözelti görünümündedir.

ETOVER, etkin madde olarak etofenamat içerir.

Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundadır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

ETOVER, ařađıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

- Spor yaralanmaları gibi knt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara bađlı ađrılı durumlar.
- Diz eklemi iltihabı durumlarında, eklem evresi yumuřak dokulardaki (bursa, tendon, bađlar ve eklem kapsl) ađrılı durumlar.

## **2. ETOVER'i kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler**

Herhangi bir ilacı kullanmadan nce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

### **ETOVER'i ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eđer,

- Etofenamata veya ETOVER'in ierdiđi maddelerden herhangi birine karřı veya diđer ađrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilalar) ařırı duyarlılıđınız (alerjiniz) varsa.
- Uygulamanız gereken cilt blgenizde egzema, aık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa.
- Dudak, burun ii ve gzler gibi mukoza alanları zerine uygulamayınız.
- Hamileliđin ge evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.
- 18 yařından kkseniz.

### **ETOVER'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer,

- Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik řiřkinliđi (nazal adenoid olarak da adlandırılır), kronik obstruktif solunum yolu hastalıđınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, zellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse.
- Bařka maddelere karřı, deri reaksiyonları, kařıntı veya rtiker řeklinde alerjik reaksiyonlar yařıyorsanız.

ETOVER, cilalı mobilya veya plastik yzeylerde hasar ve renk deđiřikliđine yol aabilir. Bu nedenle, ETOVER'i uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız veya yukarıdaki maddelerle temastan kaınınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

## **ETOVER'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileşimi yoktur.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ETOVER hamileliđin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dnemden ncede doktorunuz kullanmanız gerektiđini belirtmedike ETOVER'i kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Etofenamatın anne stne kuk miktarlarda gemesi nedeniyle ETOVER'i uzun sreli kullanmayınız ve gnlk dozu kesinlikle ařmayınız. Bebeđinizin emzirilmesi sırasında, ilacın bebeđe gemesinden kaınmak iin gđs blgesinde ETOVER kullanmayınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

ETOVER'in ara veya makine kullanma becerinizi etkilediđine dair bilgi yoktur.

## **ETOVER'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

ETOVER'in ieriđinde bulunan propilen glikol, ciltte tahriře neden olabilir.

## **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Etofenamatın deri zerine nerildiđi řekilde kullanımında herhangi bir ila etkileşimi bildirilmemiřtir.

*Eđer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **3. ETOVER nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

Doktorunuz hastalıđınıza bađlı olarak ETOVER dozunu size syleyecektir. Doktorunuz tarafından bařka trl belirtilmedike ařađıdaki talimatlara uyunuz.

ETOVER'i, vücudunuzun etkilenen kısımlarına ve çevresindeki alana, günde 4 kez 7 püskürtme (1 püskürtme 18 mg etofenamata eşdeğerdir) şeklinde uygulayınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

ETOVER sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. Asla yutmayınız.!

ETOVER'i etkilenen bölgeye 1 veya 2 kez püskürttükten sonra hafifçe ovarak yediriniz ve kurummasını bekleyiniz. Doktorunuz belirtmedikçe üzerini bandajla kapatmayınız.

ETOVER ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir. Spor yaralanmaları gibi күnt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi yeterlidir.

Romatizmal hastalıklar için, 3-4 haftalık tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır. Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza danışınız.

**Değişik yaş grupları**

**Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda etofenamat ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda ETOVER kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda (65 yaş üzeri) kullanımı:**

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

**Özel kullanım durumları**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

*Eğer ETOVER'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla ETOVER kullandıysanız**

Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, ETOVER'i deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.

*ETOVER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

## **ETOVER'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **ETOVER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

### **4. Olası yan etkiler**

Tüm ilaçlar gibi, ETOVER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır.

- Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın : 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek :1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

ETOVER , geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.

### **ETOVER için bildirilen istenmeyen etkiler**

- Yaygın olmayan:
- Ciltte kızarıklık
  - Kaşıntı
  - Yanma hissi
  - Deri döküntüsü
  - Bazen kabarcıklar ve ürtiker tarzı bölgesel deri reaksiyonları
- Seyrek:
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları
  - Bölgesel alerjik reaksiyonlar (temas dermatiti)

*Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek yoktur.*

*Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

*Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.*

#### **5. ETOVER’in saklanması**

*ETOVER’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*25 °C’nin altında ki oda sıcaklığında saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ETOVER’i kullanmayınız.*

#### ***Ruhsat Sahibi:***

*Haver Farma İlaç A.Ş.*

*Acarlar Mah. 74. Sok. Acarkent Sitesi*

*B742 No.:17/1 Beykoz / İstanbul*

*Tel : (0216) 324 38 38*

*Fax: (0216) 317 04 98*

#### ***Üretim Yeri :***

*Farmamağ Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.*

*Bağlariçi Caddesi No: 14 Avcılar/İstanbul*

*Tel: 0212 694 33 51*

*Fax: 0212 694 62 94*

*Bu kullanma talimatı 27.04.2017 tarihinden itibaren onaylanmıştır.*