

KULLANMA TALİMATI

MİNODERMO FORT %5 Deri Spreyi

Kuru saç ve kafa derisine haricen uygulanır.

•**Etkin madde:**

Bir şişe (60 mL) sprey 3 g Minoksidil içerir.

•**Yardımcı maddeler:**

Propilen glikol, etanol, sitrik asit monohidrat, deiyonize su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin için reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de **MİNODERMO FORT**'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullarıma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza dampsınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

- 1. MİNODERMO FORT nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. MİNODERMO FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. MİNODERMO FORT nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. MİNODERMO FORT'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MİNODERMO FORT nedir ve ne için kullanılır?

- Bir şişe MİNODERMO FORT (60 mL) 3 g Minoksidil içerir.
- MİNODERMO FORT, topikal saç büyümesi uyarıcı bir ilaçtır.
- Bir şişe MİNODERMO FORT (60 mL) 30 günlük kullanım dozu içerir. Her bir püskürtme (0,2 mL) 10 mL Minoksidil içerir.
- MİNODERMO FORT; kellik (Androgenetik Alopesi)'in uzun süreli tedavisinde, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında kullanılır.

2. MİNODERMO FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MİNODERMO FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- MİNODERMO FORT, erkekler içindir.
- Eğer MİNODERMO FORT'un içeriğinde bulunan etkin madde Minoksidil'e veya formülasyon içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız,
- Eğer saçlı kafa derinizde iltihap, kızarıklık, enfeksiyon, tahriş gibi cilt hastalıkları var ise,

- Eđer Guanetidin ieren bir ila kullanıyorsanız,
- Eđer 18 yařından kk veya 65 yařından bykseniz.

MİNODERMO FORT'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Eđer karaciđer veya bbrek yetmezliđiniz var ise,
- Eđer kardiyovaskler hastalıđınız var ise,
- Eđer diretik veya antihipertansif ila kullanıyorsanız, MİNODERMO FORT'u kullanmadan nce doktora danıřınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

MİNODERMO FORT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

- MİNODERMO FORT, erkekler iindir.
- Topikal uygulanan Minoksidil ile hayvanlarda ve gebelerde yeterli arařtırma mevcut deđildir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı almadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

- MİNODERMO FORT, erkekler iindir.
- Minoksidil'in topikal uygulamada az miktarda da olsa ste getiđi bilinmektedir, Potansiyel yan etkilerden dolayı emzirme dneminde kullanılmamalıdır.

Ara ve makine kullanımı

MİNODERMO FORT'un ara ve makine kullanma becerisini etkilediđini gsteren hibir veri bulunmamaktadır.

MİNODERMO FORT'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

- MİNODERMO FORT'un ieriđindeki alkol, gz, mukozalar veya duyarlı ya da btnlđn yitirmiř deri blgeleri ile temas ettiđinde yanma hissine ve tahriře neden olabilir. Bu tip blgelerle temas etmesi halinde, temas blgesi bol sođuk su ile yıkanmalıdır.
- MİNODERMO FORT'un ierisindeki propilen glikol, ciltte iritasyona neden olabilir.

Diđer ilalarla birlikte kullanımı

- Diretik veya diđer antihipertansif bir ila kullanıyorsanız, doktora danıřmadan kullanmayınız.
- Guanetidin kullanıyorsanız, MİNODERMO FORT'u kullanmayınız.
- MİNODERMO FORT'u, salı deriye uygulanan diđer ilalarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz,


3. MİNODERMO FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

- MİNODERMO FORT'u saç dökülmesi olan bölgeye; günde 2 kez 5 püskürtme (1 ml) sabah ve akşam olmak üzere uygulayınız.
- MİNODERMO FORT'u kuru saç ve kafa derisi dışında vücudunuzun hiçbir yerine kullanmayınız.
- Kuru saç ve kafa derisi dışında herhangi bir bölgeye istenmeden temas ettirildiğinde, bölgeyi bol su ile yıkayınız.
- Saç ile ilgili yapılacak kimyasal işlemlerden (boya, perma vb.) 24 saat önce MİNODERMO FORT'un kullanımı bırakılmalıdır.
- Saç spreyi, jöle, şampuan veya diğer benzer kimyasal içerikli saç ürünleri MİNODERMO FORT uygulamasından en az 30 dakika sonra kullanılmalıdır.
- Güneş kremleri MİNODERMO FORT'un etkisini azaltabileceğinden, MİNODERMO FORT uygulanan kafa derisi üzerine en az 4 saat sonra kullanılmalıdır.
- Tedaviyi erken kesmeyiniz; çünkü MİNODERMO FORT, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç çıkmasının sağlanmasında uzun süreli kullanılır. Saç çıkması 4 ila 6 ay sürekli uygulamadan sonra, maksimum etki 12 ay sonunda görülür.
- İlacınızı zamanında kullanmayı unutmayınız.
- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

- MİNODERMO FORT'u saç dökülmesinin olduğu bölgeye bir kez püskürtüp, parmaklarınızla masaj yaparak yayınız.



- Bu işlemi 5 kez tekrarlayıp, ardından ellerinizi iyice yıkayınız.
- Bölgenin büyüklüğü ne olursa olsun 5 püskürtmeyi (1 mL) aşmayınız.
- Bir şişe MİNODERMO FORT 30 günlük kullanım dozu içerir.
- MİNODERMO FORT haricen uygulanır. Ağız ve nefes yoluyla kullanmayınız ve içmeyiniz.
- Minoksidil'in yanlılıkla içilmesi durumunda sıvı tutulumu ve çarpıntı ile karakterize bir kardiyovasküler tablo ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda sıvı tutulumu uygun bir idrar söktürücü tedavisi ile düzeltilebilir. Klinik olarak önemli çarpıntı bir beta blokede kontrol altına alınabilir. Hipotansiyon gelişmesi durumunda sıvı replasmanı ile tedavi edilmelidir. Norepinefrin ve epinefrin gibi ilaçlardan, aşırı kardiyak uyarıcı etkileri nedeniyle sakınılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.
- Eğer MİNODERMO FORT'un etkisini çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

18 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşından büyüklerde kullanılmaz.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği**

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda ilacın metabolizması veya böbrekten eliminasyonunun etkilenebilmesi olasılığı göz önüne alınarak, bu tip hastalar MİNODERMO FORT'u doktora danışmadan kullanmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MİNODERMO FORT kullandıysanız:

MİNODERMO FORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz,

MİNODERMO FORT'u kullanmayı unutursanız:

MİNODERMO FORT'u kullanmayı unutursanız, bir sonraki gün yine normal dozlarda kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MİNODERMO FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında; tedavinin sağladığı yarar ortadan kalkmakta, saç dökülmesi tekrar başlamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MİNODERMO FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MİNODERMO FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani alerji işaretleri; örneğin eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde, ciltte döküntü (ürtiker), ani tansiyon düşmesi (Hipotansiyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİNODERMO FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Göğüs ağrısı (Angina),
- Kalp atışınızda değişiklikler (Hızlanma veya yavaşlama),
- Nefes almada zorluk (Özellikle yatar pozisyona geçildiğinde),
- Açıklanamayan hızlı kilo alma,
- Öncesine göre daha az idrara çıkma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bu yan etkiler görülme sıklığına göre sıralanmıştır.

- Uygulama yerinde ortaya çıkan kaşıntı,
- Ciltte kuruma,
- Pullanma,
- Ciltte tahriş ve yanma,
- Baş ağrısı,
- Egzama,
- Kabuklanma

Bunlar MİNODERMO FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ İlaç Yan Etki Bildirimi “ ikonuna tıklayarak yada 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MİNODERMO FORT'un saklanması

MİNODERMO FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği, yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Aşırı sıcaktan ve ateşten uzak tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİNODERMO FORT'u kullanmayınız.

Eğer üründe bozulma veya deforme varsa kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Dermotek İlaç Gıda Ve Dermokozmetik San.Tic.Ltd.Şti.

Merkez Kavak Sok. No:21 Yenibosna-Bahçelievler / İstanbul

Tel:0212 654 71 94

Fax:0212 654 76 86

Üretim Yeri;

Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güllü Bağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sk. No: 14 Kurtköy-Pendik / İstanbul

Bu kullanma talimatı (.....) tarihinde onaylanmıştır.