

## KULLANMA TALİMATI

### TROMCARDIN ampul

Damar içine uygulanır.

- **Etkin madde:** 10 ml'lik her bir ampul 0,500 g rasemik potasyum aspartat hemihidrat (= 2,8 mmol = 2,8 mval = 109,5 mg potasyum) ve 0,500 g rasemik magnezyum aspartat tetrahidrat (= 1,4 mmol = 2,8 mval = 34 mg magnezyum) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** 1N sodyum hidroksit çözeltisi (pH ayarlayıcısı olarak), 1N hidroklorik asit (pH ayarlayıcısı olarak) ve enjeksiyonluk su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **TROMCARDIN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TROMCARDIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TROMCARDIN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TROMCARDIN'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. TROMCARDIN nedir ve ne için kullanılır?

- TROMCARDIN, damar içine uygulanan bir çözeltidir ve mineral destekleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.
- TROMCARDIN, 10 ml'lik renksiz cam ampul içerisinde ambalajlanmıştır. Her kutu 5 ampul içermektedir.
- TROMCARDIN, hem magnezyum hem de potasyumun birlikte eksik olduğu durumlarda kullanılır.

## 2. TROMCARDIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### TROMCARDIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer ağır böbrek hastalığınız varsa,
- Kanda potasyum ve magnezyum seviyeleriniz yüksek olduğunda,
- Eğer kalbinizde ciddi ileti bozuklukları varsa,
- Eğer idrar söktürücü veya bazı tansiyon ilaçları (ADE inhibitörü ve ARB adı verilen grupta bulunanlar) kullanıyorsanız,
- TROMCARDIN'in, bileşiminde yer alan etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

### TROMCARDIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer böbreklerinizin çalışmasında kısıtlılık varsa (ameliyat geçirmek gibi nedenlerle),
- Eğer sıvı kaybınız artmışsa (ateş, ishal, kusma gibi sebeplerle).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### TROMCARDIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

TROMCARDIN, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme döneminde TROMCARDIN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına doktorunuz karar verecektir.

## **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

## **TROMCARDIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

TROMCARDIN, her 10 ml'lik ampulde 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

## **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı**

İdrar söktürücü (Potasyum tutucu diüretikler) veya bazı tansiyon ilaçları (ADE inhibitörü ve ARB adı verilen grupta bulunanlar) kullanıyorsanız TROMCARDIN kullanırken dikkatli olunuz.

Magnezyum içerdiğinden TROMCARDIN ile tetrasiklinler (antibiyotik) ya da demir preparatları arasında birbirlerinin emilimini engelleyici yönde etkileşimler olabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. TROMCARDIN nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

TROMCARDIN'in hızlı bir şekilde verilmesi durumunda yan etkiler ortaya çıkabilir.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

TROMCARDIN damarınızın içine doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda TROMCARDIN dozu hastanın kilosuna ve ihtiyacına göre belirlenir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yapılan çalışmalar, yaşlılar ile gençler arasında kullanım açısından farklılık olmadığını göstermektedir. Böbrek bozukluğu olanlarda yan etki görülme olasılığı daha fazladır. Yaşlı hastalarda da böbreklerin çalışmasında bozukluk olabileceğinden kullanılacak TROMCARDIN miktarı dikkatli şekilde belirlenmelidir.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek/Karaciğer yetmezliği**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda TROMCARDIN kullanımı kandaki magnezyum ve potasyum miktarlarının yükselmesine neden olabilir.

Böbrek yetmezliğine neden olabilecek karaciğer hastalığı olan hastalarda magnezyum zehirlenmesi gelişebileceğinden, damar içine magnezyum uygulaması sırasında dikkatli olunmalıdır.

*Eğer TROMCARDIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız:**

*TROMCARDIN'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**TROMCARDIN'i kullanmayı unutursanız:**

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına umanız önemlidir.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**TROMCARDIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, TROMCARDIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, TROMCARDIN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kas kasılmalarının geçici veya kalıcı azalması ya da kaybolması (felç durumu)
- Havale
- Çift görme
- Çarpıntı
- Kalbin yavaş atması
- Solunum durması

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Sersemlik hissi
- Düşük tansiyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Terleme
- Üşüme
- Bulantı
- Kusma
- Karın ağrısı
- İshal

- Kaslarda güçsüzlük
- Lokal kas kasılmaları
- Dışkılama ihtiyacında artış

Bunlar, TROMCARDIN'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. TROMCARDIN'in saklanması**

*TROMCARDIN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki/kartondaki son kullanma tarihinden sonra TROMCARDIN'i kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No: 88

55020 – SAMSUN

Tel: (0362) 431 60 45 (Fabrika)

(0362) 432 60 46 (Fabrika)

Fax: (0362) 431 96 72 (Fabrika)

**Üretim yeri:** ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No: 88

55020 – SAMSUN

Tel: (0362) 431 60 45 (Fabrika)

(0362) 432 60 46 (Fabrika)

Fax: (0362) 431 96 72 (Fabrika)

*Bu kullanma talimatı en son ..... 'de onaylanmıştır.*