

## KULLANMA TALİMATI

**NOTUSS FORT şurup**  
**Ağızdan alınır.**

**Etkin madde:** Her 5 ml şurup 22.5 mg butamirat sitrat içerir.

**Yardımcı maddeler :** Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sorbitol % 70 non-kristalin, propilen glikol, gliserin, sukraloz, sodyum benzoat, masking flavour, portakal aroması, deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **NOTUSS FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NOTUSS FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NOTUSS FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NOTUSS FORT' un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. NOTUSS FORT nedir ve ne için kullanılır?**

NOTUSS FORT, 100 ml'lik renkli şişede ölçekle beraber sunulan şuruptur.

NOTUSS FORT etkin madde olarak butamirat sitrat içerir.

Ani başlayan öksürük, cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi için kullanılır.

#### **2. NOTUSS FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**NOTUSS FORT 'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer butamirat sitrata veya NOTUSS FORT'un bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

## **NOTUSS FORT ’u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Hamileliđinizin ilk üç ayında doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

“Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.”

### **NOTUSS FORT’un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yiyecek ve ieceklerle etkileřimi bildirilmemiřtir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Gerekli olduđu durumlarda doktorunuzun kontrol altında kullanınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

NOTUSS FORT’un anne stne geip gemediđi bilinmediđinden doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanım becerisi zerine etkileri hakkında hibir veri bulunmamaktadır. Butamirat sitrat, bař dnmesine sebep olabileceđinden, ara ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

### **NOTUSS FORT ’un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

İeriđinde bulunan Sorbitol nedeniyle, eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıđınız olduđu sylenmiřse NOTUSS FORT’u almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

NOTUSS FORT, 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserin ierir. Gliserin’e karřı herhangi bir etki beklenmez.

Bu tıbbi rn her 5 ml’sinde 8.75 mg sodyum sitrat dihidrat ve 5.00 mg sodyum benzoat ihtiva eder. Bu durum, kontroll sodyum diyetinde olan hastalar iin gz nnde bulundurulmalıdır.

İeriđinde propilen glikol bulunmaktadırdır ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

NOTUSS FORT'un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

*Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. NOTUSS FORT nasıl kullanılır ?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :**

- NOTUSS FORT yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 5 ml olmak üzere kullanılır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

- NOTUSS FORT sadece ağızdan kullanım içindir.
- Ölçek kullanılarak şurup içilir.

### **Değişik yaş grupları :**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 2 defa 5 ml

12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 5 ml

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

NOTUSS FORT'un yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

### **Özel kullanım durumları :**

#### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

NOTUSS FORT'un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

*Eğer NOTUSS FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

## **Kullanmanız gerekenden daha fazla NOTUSS FORT kullandıysanız**

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme.

*NOTUSS FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

## **NOTUSS FORT 'u kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **NOTUSS FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir ?**

Tüm ilaçlar gibi NOTUSS FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, NOTUSS FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :**

- Deri döküntüleri

'Bu çok ciddi bir yan etkidir.

Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin NOTUSS FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

'Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.'

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Hafif deri döküntüsü

'Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.'

'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.'

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :**

- Mide bulantısı,
- İshal
- Baş dönmesi

'Bunlar NOTUSS FORT'un hafif yan etkileridir.'

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5. NOTUSS FORT 'un saklanması**

*NOTUSS FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NOTUSS FORT'u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *NOTUSS FORT'u* kullanmayınız.

***Ruhsat sahibi:***

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467  
Maslak / Sarıyer / İstanbul

***Üretim yeri:***

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Sanayi Mah. Tunç Cad. No : 3  
Esenyurt / İstanbul

*Bu kullanma talimatı 17.08.2011 tarihinde onaylanmıştır.*